

アスパラガス栽培管理 (H28.12.)

(有) 丸 富

11 月前半は気温が高く、地温も高かったので、収穫を終えても若茎が伸びているところがあった。後半になって三寒四温で徐々に気温が下がり、黄化も遅れているが、少しずつ進み始めた。

礼肥

黄化が始まる頃まで、春芽の充実を促進するように、礼肥を施す。

遅くまで肥料が残らないものを施す。**プロ液肥 2~3 kg/10a** と **時を越えた贈り物 200~300g/10a** を灌水する。

黄化対策

遠日点では栄養生長するので、黄化しにくい。C/N 比が上がると、黄化が促進する。

黄化を助ける **時を越えた贈り物 500 倍** (又は **オリゴファイト 2,000 倍**) と **サンミネラル 5,000 倍** を適宜散布する。

害虫対策

今期に害虫が発生した圃場は、全刈り後のガスバーナー焼却処理の際に、害虫が残らないよう焼却する。

害虫の侵入や繁殖を減少するよう **バイオアクト TS 50~70cc/10a** を 5~7 日ごとに灌水する。

モグラやネズミ対策も害虫と同様に、侵入する前から **バイオアクト TS 50~70cc/10a** を灌水する。

病害対策

健全な株の育成は土づくりから。土壌改良時に肥料や土壌改良剤と一緒に混和する。

病害抵抗性を促進する **ハイプロ 5~10 袋/10a** と **バイデルマ 5~10 袋/10a** を施用する。

酸素供給

春芽を多く収穫するためには、吸収根を元気な状態で維持する。土壌改良時に肥料と一緒に混和する。

酸素供給と根に有害なガスを除去する **G バランス細粒 10kg/10a** を撒布する。(施用効果、約 3 ヶ月間)

保温開始後の施用は **G バランス DF 1~2kg/10a** を灌水する。(施用効果、約 1 ヶ月間)

追肥(液肥)

保温前に萌芽を促進する **バイオシャイングリーン 2~3 kg/10a** (又は **天地の恵み 1 kg/10a**) を灌水する。

萌芽し始めたら、生長を助ける **笑顔 500 倍** (又は **バイオシャインゴールド 1,000 倍**) と **サンミネラル 10,000 倍** を適宜(1~3 日毎に)散布する。

プロ液肥 2~3kg/10a

時を越えた贈り物 200~300g/10a

サンミネラル 50g/10a

バイオアクト TS 50~70cc/10a

10~15日ごとに灌水する。

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネラルの代わりにグリーンバ イタリティ 100~150cc、K-40 100g、海藻のエキス 50g でもいい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)