

# いちご栽培管理 (H28.12.)

(有) 丸 富

11 月前半は比較的温が高く、依然と病害の発生が続いた。生長や花芽分化にもばらつきがあった。後半は三寒四温で徐々に冷えてきたが、以前の曇天と高温の影響で果実の肥大が悪く、小玉傾向で収穫が始まった。

## 電照対策

電照が長いと軟弱徒長し、ウドンコ病などが発生しやすい。また、花粉が弱くなり、不受精果が多くなる。

## 着色・肥大促進

遠日点ではイチゴが栄養生長するので、着色や肥大が悪い。

着色を促進する**笑顔 1000 倍**(又は**天地の恵み 500 倍**)と**サンミネラル 10,000 倍**を葉面散布する。

果実が肥大する**K-40 250g/10a**と**サンミネラル 50g/10a**を灌水する。

## 細胞分裂促進

細胞分裂の促進に**バイオシャイングリーン 3 kg/10a**(又は**天地の恵み 1 kg/10a**)と**サンミネラル 100g/10a**を三番花房の花芽分化後に 2 回灌水する。

※同時に**笑顔 1000 倍**(又は**天地の恵み 500 倍**)と**サンミネラル 10,000 倍**を 3~4 回葉面散布する。

## 病害対策

遠日点の新月頃や低気圧時に軟弱徒長すると、ウドンコ病などが発生しやすい。

健全な株の育成に**時を越えた贈り物 500 倍**(又は**オリゴファイト 2,000 倍**)と**サンミネラル 5,000 倍**(又は**グリーンバイタリティ 5,000 倍**)を葉面散布する。

## 害虫対策

健全な株を育成すると、ダニなど害虫の発生が減少する。周辺環境の変化にも気を配り、早めの対策を。

害虫が発生する前に**笑顔 1000 倍**(又は**天地の恵み 500 倍**)と**バイオアクト TS 2,000 倍**を葉面散布する。

※アブラムシが発生している時は**笑顔 1000 倍**(又は**天地の恵み 500 倍**)の代わりに**時を越えた贈り物 500 倍**を散布する。

灌水の場合は**バイオアクト TS 50~70cc/10a**を混用する。蚜、モグラ対策は**バイオアクト TS**を灌水する。

## 追肥(液肥)

土壌や肥料の施用量で異なるが、追肥(液肥)はできる限り少量多回数で灌水することが大事。

**時を越えた贈り物 200~300g**

**プロ液肥 5~7 kg**

**サンミネラル 50g**

**バイオアクト TS 50~70g**

**5~7 日毎に灌水する場合**

**※生育状況に合わせて増減する。**

※サンミネラルの代わりに、グリーンバイタリティ 100~150cc、海藻のエキス 50g、K-40 100g、根酸 100g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

**FAX0942-65-1091** (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)