アスパラカ ス栽培管理(H29.2.)

(有) 丸 富

1 月は朝晩の冷え込みが厳しかったが、天気に恵まれた。しかし、曇天や強風で荒れることも多く、天候は不順だった。保温しても天気が定まらないと、地温が上がらず収穫量が伸び悩んだ。

萌芽したら

若茎の生長を促進するよう、アスパラガスに直接栄養を施す。

若茎の生長促進に**笑顔 1,000 倍**(又は**天地の恵み 500 倍**)と**サンミネーラ 10,000 倍**を 1~3 日毎に葉面散布する。

土壌微生物の活性に**時を越えた贈り物 1 kg/10a**(又は**天地の恵み 1 kg/10a**)とサンミネーラ 50~100g/10a(又はシリカアップ 200~300 cc/10a)を潅水する。

偏平・曲がり対策

規格外品や偏平、曲がりなどは養分バランスの崩れから生じるので、日頃からバランスを考えて施肥する。 偏平対策にジャストマケ3~4袋/10aを施用する。曲がり対策にカルスター2~3袋/10aを施用する。

立茎前に

立茎前に、株に養分を補給すると、スムーズに若茎の生長がよく、立茎しやすい。 若茎の生長を促進する**天地の恵み 1~2 kg/10a** とサンミネーラ 50~100g/10a(又はシリカアップ 200~300 cc/10a)を潅水する。

発根促進

若茎を生長させるには、元気な吸収根(細根)が大切。吸収根が微量要素など大切な養分を吸収する。 発根と根張り促進に**発根力 12/10a**と G ハランス DF 1kg/10a を潅水する。(施用効果、約 1 ヶ月)

害虫対策

近日点では害虫が発生しやすいので、害虫が繁殖する前に予防・抑制する。

50~70cc/10a

害虫の侵入や繁殖を減少するように**バイオアクトTS 50~70cc/10a** を 5~7 日ごとに潅水する。 ダニを寄せ付けない株作りに**笑顔 1,000 倍(**又は**天地の恵み 500 倍)とサンミネーラ 10,000 倍**を散布する。

追肥(液肥)

プロ液肥 3~5kg/10a 時を越えた贈り物 200~300g/10a サンミネーラ 50g/10a

5~7 日ごとに潅水する。 ※収穫量や土壌条件

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネーラの代わりにシリカアップ $100\sim150$ cc、K-40 100g、海藻のエキス 50g でもいい。

ご注文やお問い合わせは、

パイオアクト TS

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX **0942-65-1091** (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)