

アスパラガス栽培管理 (H29.3.)

(有) 丸 富

2 月は時々荒天で強風が吹くこともあったが、気温が高く、地温が上がった。アスパラガスは細く収穫量が伸び悩んだ。病害虫の発生はまだ少なかったが、近日点だから今後害虫の発生に注意が必要。

生長促進

若茎の生長を促進するよう葉面散布する。

生長促進に**笑顔 1,000 倍**(又は**天地の恵み 500 倍**)と**サンミネ-ラ 10,000 倍**を適宜(1~3 日毎に)散布する。

曲がり、偏平対策

土壌養分バランスが乱れると、曲がりや偏平が多くなるので、追肥量に応じてその他の成分も施す。

曲がりや偏平対策に**カルスター 2 袋/10a**と**ジャストマグ 2~3 袋/10a**を撒布する。(2 ヶ月に 1 回)

害虫対策

近日点では害虫が発生しやすいので、事前に繁殖を抑制するように対策する。

害虫の外部侵入や繁殖を軽減するよう**バイオアクト TS 50~70cc/10a**と**時を越えた贈り物 200cc/10a**を 5~7 日ごとに灌水する。モグラやネズミも、侵入する前から**バイオアクト TS 50~70cc/10a**を灌水する。

立茎前に

立茎 3~5 日前に、生長を促進するよう土壌と微生物に栄養を施す。

立茎前に**バイオシャイングリーン 2~3 kg/10a**(又は**天地の恵み 1 kg/10a**)と**サンミネ-ラ 50~100g/10a**(又は**シカアップ 200~300 cc/10a**)を灌水する。

病害対策

通気性の確保と健全な株の育成、病害抵抗性を強化するなど事前に対応することが、病害予防に繋がる。

光合成を促進し、窒素消化する**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**サンミネ-ラ 10,000 倍**を散布する。

酸素供給と発根促進

元気な吸収根の維持と新しい根を発生させ、株を健全に育てる。

酸素供給と発根促進に**G バランス DF 1kg/10a**と**発根力 1ℓ/10a**を灌水する。(1 ヶ月に 1 回灌水)

追肥(液肥)

プロ液肥	2~3kg/10a
時を越えた贈り物	200~300g/10a
サンミネラル	50g/10a
バイオアクト TS	50~70cc/10a

5~10日ごとに灌水する。
※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネラルの代わりにシカアップ 100~150cc、K-40 100g、海藻のエキス 50g でもいい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)