

アスパラガス栽培管理 (H29.4.)

(有) 丸 富

3月は朝晩の冷え込みが厳しく、地温が低めで推移したため、若茎が細くて伸びが悪く、収穫量が伸び悩んだ。そのため、早めに立茎された方が多かった。病害虫は少なかったが、近日点だから害虫の発生に注意が必要。

立茎前に

立茎3～5日前に、茎葉の伸長を促進するよう栄養を補給する。立茎中も伸長促進に、栄養養分を施す。立茎前、立茎中に**バイオシャイングリーン 2～3 kg/10a**(又は**天地の恵み 1 kg/10a**)と**サンミネーラ 50～100g/10a**(又は**シリカアップ 200～300 cc/10a**)を灌水する。

生長促進

立茎中も茎葉の生長が悪い場合は、伸長を促進するよう、茎葉に直接散布する。生長促進に**笑顔 1,000倍**(又は**天地の恵み 500倍**)と**サンミネーラ 10,000倍**を適宜(1～3日毎に)散布する。

害虫対策

近日点では害虫が発生しやすいので、できる限り害虫が発生する前に、繁殖を抑制するよう管理する。外部からの侵入や繁殖を軽減するよう**バイオアクト TS 50～70cc/10a**と**時を越えた贈り物 200cc/10a**を5～7日ごとに灌水する。

曲がり、偏平対策

地温が低い時、光が弱い時は根から微量要素を吸収しにくいので、状況に応じて適宜微量要素を施す。曲がりや偏平対策に**カルスター 2袋/10a**と**ジャストマグ 2～3袋/10a**を撒布する。(2ヶ月に1回)光が弱く養分を吸収しにくい時は**ウルカル 0.5～1 kg/10a**と**サンミネーラ 50～100g/10a**を灌水する。

病害対策

病害抵抗性が強化するよう、光合成を促進し、窒素を消化させる。通気性の改善が病害予防に繋がる。充実した茎葉づくりに**時を越えた贈り物 1,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を時々散布する。

酸素供給と発根促進

酸素供給と発根促進に**G バランス DF 1kg/10a**と**発根力 1ℓ/10a**を灌水する。(1ヶ月に1回灌水)

追肥(液肥)

プロ液肥	3～5kg/10a
時を越えた贈り物	200～300g/10a
サンミネーラ	50g/10a
バイオアクト TS	50～70cc/10a

5～7日ごとに灌水する場合
※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネーラの代わりにシリカアップ 100～150cc、K-40 100g、根酸 100～150g でもいい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)