

アスパラガス栽培管理 (H29.5.)

(有) 丸 富

4 月になっても朝晩が冷え込み、地温が低く、細ものが多く、収穫量が伸び悩んだ。病害虫の発生はまだ少なかったが、アブラムシやスリップスなど害虫の発生に注意が必要。

害虫対策

ハウス周辺の麦や玉ねぎなどの変化次第で、害虫が飛び込みやすい状況にある。害虫の飛び込みが予測できる場合は速やかに繁殖を抑制するよう防除する。

外部からの侵入や繁殖を軽減するよう**バイオアクト TS 50~70cc/10a**と**時を越えた贈り物 200cc/10a**を5~7日ごとに灌水する。

夏芽前に

摘芯3~5日後に、若茎の伸長を促進するよう栄養補給する。

摘芯後に**バイオシャングリーン 2~3 kg/10a**(又は**天地の恵み 1 kg/10a**)と**サンミネーラ 50~100g/10a**(又は**シリカアップ 200~300 cc/10a**)を灌水する。

病害対策

土壌表面の病害抵抗性を強化するよう**ハイプロ 1~2 袋/10a**を表層施用する。病害対策は通気性が大事。窒素消化を促進する**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を時々散布する。

生長促進

若茎や茎葉の生長が悪い場合は、伸長を促進するよう、若茎や茎葉に直接散布する。

生長促進に**笑顔 1,000 倍**(又は**天地の恵み 500 倍**)と**サンミネーラ 10,000 倍**を適宜(1~3日毎に)散布する。

曲がり、偏平対策

光が弱い時は根から微量元素を吸収しにくいので、状況に応じて適宜微量元素を施す。

曲がりや偏平対策に**カルスター 2 袋/10a**と**ジャストマグ 2~3 袋/10a**を散布する。(2ヶ月に1回)

酸素供給と発根促進

酸素供給と発根促進に**G バランス DF 1kg/10a**と**発根力 1ℓ/10a**を灌水する。(1ヶ月に1回灌水)

追肥(液肥)

プロ液肥	5~7kg/10a
時を越えた贈り物	200~300g/10a
サンミネーラ	50g/10a
バイオアクト TS	50~70cc/10a



5~7日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネーラの代わりにシリカアップ 100~150cc、K-40 100g、根酸 100~150g でもいい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)