

# アスパラガス栽培管理 (H29.6.)

(有) 丸 富

5 月は夏のような天気になり、気温が上がったが、涼しく乾いた風が吹いた。展開するのに時間がかかり、夏芽の発生が遅れた。アブラムシやスリップスなど害虫が多く発生した。病害の発生は少なかった。

## 害虫対策

麦や玉ねぎなどを収穫すると、害虫が飛び込む。害虫が飛び込んだら、速やかに防除する。

害虫の繁殖や外部からの害虫侵入を軽減するよう**バイオアクト TS 50~70cc/10a** と **時を越えた贈り物 200cc/10a** を 5~7 日ごとに灌水する。

防除時に**バイオアクト TS 2,000~3,000 倍** と **時を越えた贈り物 1,000~2,000 倍** を混用して散布する。

## 摘芯後に

摘芯によるダメージで、摘芯後は樹勢が低下する。速やかに樹勢回復を図り、若茎の伸長を促進する。

樹勢回復に**笑顔 1,000~2,000 倍**(又は**天地の恵み 1,000 倍**)と**サンミネーラ 10,000 倍**(又は**シカアツプ 10,000 倍**)を 3~5 回葉面散布する。

摘芯後に**バイオシャイングリーン 2~3 kg/10a**(又は**天地の恵み 1 kg/10a**)と**サンミネーラ 50~100g/10a**(又は**シカアツプ 200~300 cc/10a**)を灌水する。

## 病害対策

遠日点で栄養生長すると病害が発生しやすい。抵抗性を強化するよう充実した株を作る。通気性が大事。

窒素消化を促進する**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を時々散布する。

## 曲がり、偏平対策

遠日点で根から微量要素を吸収しにくいので、状況に応じて適宜微量要素を施す。

微量要素の補給に**サンミネーラ 1,000~2,000 倍**を時々散布する。

曲がりや偏平対策に**カルスター 2 袋/10a**と**ジャストマグ 2~3 袋/10a**を散布する。(2 ヶ月に 1 回)

## 酸素供給と発根促進

地温が高くなると、土壌中の溶存酸素が低下するので、状況に応じて適宜根に酸素を施す。

酸素供給と発根促進に**G バランス DF 1kg/10a**と**発根力 1ℓ/10a**を灌水する。(1 ヶ月に 1 回灌水)

## 追肥(液肥)

プロ液肥	5~7kg/10a
時を越えた贈り物	200~300g/10a
サンミネーラ	50g/10a
バイオアクト TS	50~70cc/10a

5~7 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネーラの代わりにシカアツプ 100~150cc、K-40 100g、根酸 100~150g でもいい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)