

いちご栽培管理 (H29.5.)

(有) 丸 富

4月は日中が暖かくなったが、まだ朝晩が冷え込み、比較的順調だった。一部でなり疲れの影響が、不受精果となった。ダニやスリップス、アブラムシも後半は増えてきた。ウドンコ病は比較的少なかった。

親苗管理

近日点ではランナーが出にくいので、ランナーが出やすい栄養生長で管理する。

親苗に**バイオシャイングリーン 500倍**(又は**天地の恵み 500倍**)と**サンミネーラ 10,000倍**を2~3回灌注する。

健全な苗の育成に**ハイプロ**をポット土に**5%**(床土1m³にハイプロ2袋)混用する。

軟弱徒長防止に**カルスター 2~3g/鉢**(アポット等は1g/鉢)を入れる。

害虫対策

害虫の発生は満月頃にイチゴが生殖生長になり、繁殖が盛んになるので、注意して観察し事前に対応する。

害虫対策に**時を越えた贈り物 1,000倍**と**バイオアクト TS 2,000倍**を葉面散布又は防除に適宜混用する。

灌水は**時を越えた贈り物 200g/10a**と**バイオアクト TS 50~70cc/10a**を3~5日毎に灌水する。

食味向上と軟果対策

果実が葉陰になると軟果し、味気ない食味になるので、緑化を促進して軟果対策と食味向上を行う。

食味向上に**天地の恵み 500g/10a**と**時を越えた贈り物 500g/10a**と**サンミネーラ 50g/10a**を灌水する。

軟果防止に**ウルカル 300~500cc/10a**と**サンミネーラ 50g/10a**を5~7日毎に灌水する。

肥大促進

ゆっくりと着色が進むようにできる限り温度を下げ、果実が肥大するように環境を整える。

果実の肥大促進に**K-40 250g/10a**と**サンミネーラ 50g/10a**を1ヶ月に2回灌水する。

発根と根張りの促進に**Gバランス DF1 kg/10a**と**発根力 1ℓ/10a**を1ヶ月に1回灌水する。

病害対策

低気圧の通過と共に雨が降ると、水と一緒に窒素を吸収するので、病害の発生が多くなる。

強健な株の育成に**オリゴファイト 2,000倍**と**サンミネーラ 2,000倍**を葉面散布して、茎葉の充実を図る。

追肥(液肥)

収穫量や着果負担によって施用量は異なるが、追肥は収穫を終了する5~7日前まで適宜灌水する。

時を越えた贈り物 200~300g

プロ液肥 1~2kg

サンミネーラ 50g

バイオアクト TS 50~70g

5~7日毎に灌水する場合

※生育状況に合わせて増減する。

※サンミネーラの代わりに、シカアップ 100~150cc、海藻のエキス 50g、K-40 100g、根酸 100gでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)