

アスパラガス栽培管理 (H29.7.)

(有) 丸 富

6 月前半は干ばつ傾向で、涼しく乾いた風が吹き、収穫量が少なく高値傾向で推移した。後半は雨が降って、生長が早くなり収穫量が増えた。スリップスの発生が多く、防除しても止まらない所があった。病害は少なかった。

曲がり、偏平対策

今年は全体的に根張りが悪いので、微量要素が吸収しにくい。微量要素は必要に応じて施す。

微量要素の補給に**サンミネーラ 2,000 倍**と**ウルカル** (又は**スーパーカル雅**) **1,000 倍**を適宜散布する。

曲がりや偏平対策に**カルスター 2 袋 / 10a**と**ジャストマグ 2~3 袋 / 10a**を散布する。(2 ヶ月に 1 回)

病害対策

遠日点の新月頃は、栄養生長傾向になるので、病害が発生しやすい。緑化の促進と抵抗性の強化を計り、充実した株を作る。

窒素消化を促進する**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を時々散布する。

害虫対策

最近防除してもスリップス (アザミヤ) が止まらない! という相談が多い。効果的な防除の工夫が必要。

害虫が発生する前から**バイオアクト TS 50~70cc / 10a**と**時を越えた贈り物 200cc / 10a**を 5~7 日ごとに灌水する。

防除時に**バイオアクト TS 2,000~3,000 倍**と**時を越えた贈り物 1,000~2,000 倍**を混用して散布する。

生長促進

植物は光合成産物で生長する。若茎の伸長を促進するには、若茎が生長する資材を直接若茎に散布する。

伸長促進に**笑顔 1,000 倍**(又は**天地の恵み 500 倍**)と**サンミネーラ 10,000 倍**(又は**シリカアップ 10,000 倍**)を 3~5 回若茎に直接散布する。

伸長促進に**バイオシャイングリーン 2~3 kg / 10a**(又は**天地の恵み 1 kg / 10a**)と**サンミネーラ 50~100g / 10a**(又は**シリカアップ 200~300 cc / 10a**)を灌水する。

酸素供給と発根促進

土壌中の溶存酸素が低下すると、根の働きが低下するので、状況に応じて適宜根に酸素を施す。

酸素供給と発根促進に**G バランス DF 1kg / 10a**と**発根力 1ℓ / 10a**を灌水する。(1 ヶ月に 1 回灌水)

追肥(液肥)

天地の恵み(プロ液肥)	200~300g (5~7kg) / 10a
時を越えた贈り物	200~300g / 10a
サンミネーラ(シリカアップ)	50g (100~150cc) / 10a
バイオアクト TS	50~70cc / 10a

5~7 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)