アスパラガス栽培管理 (H29.8.)

(有) 丸 富

7月前半は台風や豪雨災害など荒れた天気が続き、その後は気温が上昇した。後半は高温乾燥で早魃傾向になり、時折記録的大雨が降った。収穫量が増えたが、規格外品も急に増えた。スリップス、ダニが少し発生した。

酸素供給と発根促進

高温時は溶存酸素が低下するので、根の働きが低下する。高温時は適宜根に酸素を施す。

酸素供給と発根促進に **G バランス DF 1kg/10a** と **発根力 1ℓ/10a** を灌水する。(1ヶ月に1回灌水)

規格外品対策

全体的に根張りが悪いので、微量要素が吸収しにくい。微量要素は作物が吸収できるような形で施す。

微量要素の補給に **サンミネーラ 3,000 倍** と **天地の恵み 1,000 倍** と **発根力 1,000 倍** を灌注又は散水する。

若茎と親株の充実に **カルスター 2 袋/10a** と **ジャストマグ 2~3 袋/10a** を撒布する。(2ヶ月に1回)

根張りが良ければ **ウルカル(又はスーパーカル雅) 1,000 倍** と **サンミネーラ 2,000 倍** を灌注又は散水する。

生長促進

若茎の伸長を促進するには、光合成産物を転流し、若茎の生長を促進する。

伸長促進に **笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)** と **サンミネーラ 10,000 倍(又はシリカアップ 10,000 倍)** を葉面散布又は灌注する。

伸長促進に **バイオシャイングリーン 2~3 kg/10a(又は天地の恵み 1 kg/10a)** と **サンミネーラ 50~100g/10a(又はシリカアップ 200~300 cc/10a)** を灌水する。

病害対策

新月頃は栄養生長するので、病害が発生しやすい。緑化促進と抵抗性強化を計り、充実した株を作る。

窒素消化を促進する **時を越えた贈り物 1,000 倍** と **サンミネーラ 10,000 倍** を時々散布する。

害虫対策

満月頃になると、害虫が盛んに活動する。害虫の動向を観察して、事前対応で予防する。

害虫が発生する前から **バイオアクト TS 50~70cc/10a(又はストップ-雅 200~300 cc/10a)** と **時を越えた贈り物 200~300cc/10a** を5~7日ごとに灌水する。

防除時に **バイオアクト TS 2,000~3,000 倍** と **時を越えた贈り物 1,000~2,000 倍** を混用して散布する。

追肥(液肥)

天地の恵み(プロ液肥)	200~300g(5~7kg)/10a
時を越えた贈り物	200~300g/10a
サンミネーラ(シリカアップ)	50g(100~150cc)/10a
バイオアクト TS	50~70cc/10a

5~7日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)