

# いちご栽培管理 (H29.8.)

(有) 丸 富

7月前半は台風や豪雨災害など荒れた天気が続き、その後はとても気温が上がった。後半は高温乾燥で早魃傾向になり、時折記録的大雨が降った。スリップス、ダニなど害虫がやや多く発生した。ウドンコ病はやや少なかった。

## 病害対策

新月頃に軟弱徒長すると、ウドンコ病などの発生が多くなるので、事前対応で回避する。

強健な株の育成に**時を越えた贈り物 1,000 倍**（又はリゴファイト 2,000 倍）と**サンミネーラ 2,000 倍**を葉面散布する。

## 害虫対策

満月頃は害虫の活動が盛んになるから、害虫の動向を観察して、事前対応で予防する。

害虫対策に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**バイオアクト TS 2,000 倍**を散布又は防除時に適宜混用する。  
灌注で**時を越えた贈り物 5,000 倍**と**バイオアクト TS 5,000 倍**を 5~10 日毎に灌注(散水)する。

## 充実促進

遠日点で徒長しやすいので、充実した苗を育成する。例年より少し抑制傾向で肥培管理する。

軟弱徒長防止に**ウルカル**（又はスーパーカル）**1,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を 7~10 日毎に散布する。

## 発根促進

高温時は溶存酸素が低下するので、根の働きに必要な酸素を供給する。こまめな管理で根の充実を図る。

樹勢回復や生育向上に**笑顔 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を数回、葉面散布する。

発根促進と酸素供給に**G バランス DF 5000 倍**と**発根力 1,000 倍**を 15~20 日毎に灌注する。

## 花芽分化促進

遠日点で栄養生長傾向になり、軟弱徒長しやすいので、充実した苗の育成を心がける。

花芽の充実促進に**カルスター 2g/鉢**と**ジャストマグ 2g/鉢**を定植 30 日前に置き肥する。(9 cmポットの場合)

止め肥~定植 15 日前まで**バイオシャイングリーン 500 倍**(又は**天地の恵み 500 倍**)と**サンミネーラ 10,000 倍**を 5 日毎に灌注する。その後、定植まで**天地の恵み 500 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を 5 日毎に灌注する。

## 追肥(液肥)

苗や鉢の大きさ、土の性質によって施用量が異なる。(置き肥を施用している場合は不要)

<b>時を越えた贈り物</b>	<b>2,000~3,000 倍</b>	} <b>5~7 日毎に灌水する場合</b> <b>※生育状況に合わせて増減する。</b>
<b>プロ液肥</b>	<b>500~1000 倍</b>	
<b>サンミネーラ</b>	<b>10,000 倍</b>	
<b>バイオアクト TS</b>	<b>3,000~10000 倍</b>	

※サンミネーラの代わりに、シカアップ 10,000 倍、海藻のエキス 10,000 倍、K-40 4,000 倍でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

**FAX0942-65-1091** (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)