

いちご栽培管理 (H29.10.)

(有) 丸 富

9月に入ったら、朝晩が涼しくなり、花芽分化しやすい天候になった。中旬は台風や低気圧で雨が多くなり、定植に支障が出る場所もあった。日中が比較的高温だったので、定植前でもダニが確認された。

発根促進

定植後出た根を如何にして大きく伸ばすかが、今シーズンを左右する。花が咲く前に、根を充実させる。生育促進と根の充実促進に**笑顔 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を数回、葉面散布する。発根促進と酸素供給に**G バランス DF 5000 倍**と**発根力 1,000 倍**を1～2回(花芽分化後に)灌注する。

腋(二番)花房の花芽分化促進

近日点で生殖生長傾向だから、花芽分化しやすく、樹勢維持を心がけ、事前に病虫害対策を図る。花芽分化促進に**時を越えた贈り物 1,000 倍**(オリゴファイト 2,000 倍)と**サンミネーラ 2,000 倍**を葉面散布する。花芽の充実促進に**カルスター 2～3 袋/10a**と**ジャストマグ 2～3 袋/10a**をマルチ被覆前に追肥する。花芽分化後、細胞分裂促進に**バイオシャイングリーン 2～3 kg/10a**(又は**天地の恵み 1 kg**)と**サンミネーラ 50～100g/10a**を2回灌水する。

病害対策

新月頃に栄養生長すると、ウドンコ病などの病害の繁殖が盛んになる。事前に株を健全化し回避する。充実株の育成に**時を越えた贈り物 1,000 倍**(オリゴファイト 2,000 倍)と**サンミネーラ 2,000 倍**を葉面散布する。

害虫対策

近日点の満月頃は特に害虫の活動が盛んになるから、害虫の動向を観察して、事前対応で予防する。害虫対策に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**バイオアクト TS 2,000 倍**を散布又は防除時に適宜混用する。事前対応で**時を越えた贈り物 200 cc/10a**と**バイオアクト TS 50～70 cc/10a**を5～7日毎に灌水する。

生長促進

近日点で連続して花芽分化すると、樹勢が低下しやすい。光合成能力が高い葉を作り、冬に備える。生産性向上に**笑顔 1,000 倍**と**ウルカル**(又は**スーパーカル**)**3,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を随時散布する。

追肥(液肥)

株の大きさ、生育状況、天候、土の性質によって施用量が異なる。観察して状況に応じて加減する。

時を越えた贈り物	200 cc/10a	} 5～7 日毎に灌水する場合 ※生育状況に合わせて増減する。
プロ液肥	500～1000 cc/10a	
サンミネーラ	50 cc/10a	
バイオアクト TS	50～70 cc/10a	

※サンミネーラの代わりに、シカアップ 100～150 cc、海藻のエキス 50g、K-40 100g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)