

アスパラガス栽培管理 (H29.12.) (有) 丸 富

11 月前半は比較的安定した天候で、ハウス内は高温傾向だったので、遅くまで収穫されたところもあった。
近日点で害虫の発生が多く、ダニやヨウムシなどが多く発生したが、問題はなかった。

黄化促進

地上部(茎葉)の養分を地下部(貯蔵根)へ転流し、黄化を促進する。ハウス内の風通しを良くし、できる限り冷やして黄化させる。

黄化促進に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**スーパーカル(又はウルカル)1,000 倍**と**サンミネーラ 2,000 倍**を散布する。

貯蔵養分対策

茎葉が黄化するまで貯蔵根への養分転流を促進し、貯蔵養分を蓄積する。

貯蔵養分の蓄積に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**K-40 1,000 倍**と**サンミネーラ 3,000 倍**を散布する。

全刈り

黄化が進み貯蔵養分が十分に蓄積し、貯蔵根の糖度が 20 度近くなったら、地上部の茎葉を全刈りする。
そのポイントは、茎をしばらく握っておいて、茎が温かくなったら、全刈りの目安。出来れば全刈りは、
地下部へ養分転流した新月頃が望ましい。

害虫対策

ガスバーナーで焼却すると、病虫害は死滅する。焼却は害虫駆除のため、念入りに焼き尽くす。

焼却では届かない土中や地下部の害虫対策に**バイオアクト TS 50~70cc/10a**を時々灌水する。

病害対策

茎枯れ病や立枯れ病などにかかり腐った株は全刈りする前に印を付けておき、冬場に根株を取り除く。
埋め戻す際に、**ハイプロ**を土に **10%**混ぜて埋め戻す。また、焼却後、防除後に**ハイプロ**を地表面に **3~5 袋**
/10a 散布する。

追肥(液肥) 黄化するまで

天地の恵み(又はプロ液肥)	200g (1kg) / 10a	} 5~7 日ごとに灌水する場合 ※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。
時を越えた贈り物	200g / 10a	
サンミネーラ(又はシリカアップ)	50g (100cc) / 10a	
バイオアクト TS	50~70cc / 10a	

土壌改良

安定して収穫するためには土づくりが大切。肥料だけでなく、微量要素や有機物を十分に投入する。

ご注文やお問い合わせは、 有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)