

いちご栽培管理 (H29.11.)

(有)丸富

10月は下旬に二度の台風接近で心配したが、被害もなく乗り越えられてよかった。近日点で害虫(ハスモンヨトウ、カミムシなど)が多く発生した。一部でタンソ病なども発生して枯れたが、病害の発生は比較的少なかった。

生長促進

近日点で生殖生長傾向だから、ダニなどが発生しやすいので、樹勢維持を心がける。

生育促進に**笑顔 1,000 倍** (又は天地の恵み 500 倍) と**サンミネーラ 10,000 倍**を数回、連続散布する。

果実の肥大促進に**K-40 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

肥大促進と転流促進に**K-40 250g/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を月に2回灌水する。

発根促進

安定して収穫量を増やすには、根の充実がとても重要である。

根量を増やし、根の充実を図るために**GバランスDF 1 kg/10a**と**発根力 1 kg/10a**を月1回灌水する。

発根を促す**オリゴファイト 2,000 倍**と**笑顔 1,000 倍** (又は天地の恵み 500 倍) を数回、葉面散布する。

病害対策

新月頃に栄養生長すると、ウドンコ病などの病害の繁殖が盛んになる。

窒素消化に**サンミネーラ 2,000 倍** (又はオリゴファイト 2,000 倍) と**K-40 1,000 倍**を葉面散布する。

害虫対策

特に、近日点の満月頃は害虫が盛んに活動するから、害虫の動向を観察して、事前対応する。

害虫対策に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**バイオアクト TS 2,000 倍**を散布又は防除時に適宜混用する。

事前対応で**時を越えた贈り物 200 cc/10a**と**バイオアクト TS 50~70 cc/10a**を5~7日毎に灌水する。

出蕾促進

ジベレリン処理で出蕾促進を行う品種は、首長果に注意して出蕾前に処理する。事前から出蕾に備える。

ジベレリン処理効果の向上に**笑顔 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**をジベレリン処理時に混用散布する。

生育促進と効果の向上に**天地の恵み 500 cc/10a**と**サンミネーラ 100 cc/10a**をジベレリン処理前に灌水する。

追肥(液肥)

株の大きさ、生育状況、天候、土の性質によって施用量が異なる。観察して状況に応じて加減する。

時を越えた贈り物 200 cc/10a

プロ液肥 1~3 kg/10a

サンミネーラ 50 cc/10a

バイオアクト TS 50~70 cc/10a

5~7日毎に灌水する場合

※生育状況に合わせて増減する。

※サンミネーラの代わりに、シカアップ 100~150 cc、海藻のエキス 50g、K-40 100g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社丸富

TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)