

いちご栽培管理 (H30.3.)

(有) 丸 富

2 月前半は曇天が多く、低温傾向で生育がやや遅れた。一部で不受精果が多かった。後半は天気が良く、気温が上り、着色が早くなった。品種によって差はあるが、ダニやウドンコ病が一部で発生した。

害虫対策

気温が上がると、害虫は盛んに活動する。害虫の動向を注意深く観察して、事前に予防する。

害虫対策に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**バイオアクト TS 2,000 倍**を散布又は防除時に適宜混用する。

日頃から**時を越えた贈り物 200 cc/10a**と**バイオアクト TS 50~70 cc/10a**を5~7日毎に灌水する。

肥大促進

暖かくなると積算温度が上がリ、着色が早くなる。果実が肥大する前に着色する。気温が上がリ小玉で着色するようになったら、日中温度をできる限り下げて果実を肥大させる。

高温時の果実肥大に**K-40 1,000 倍**と**サンミネーラ 3,000 倍**を適宜、葉面散布する。

根が動き出したら**K-40 250g/10a**と**サンミネーラ 100g/10a**を1ヶ月に2回灌水する。

電照

芯葉が動き出し若竹色になったら電照を切る。電照を点けて収穫する場合は、芯葉が動き出す前に切る。

出蕾促進や着色促進に**笑顔 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を2~3回、葉面散布する。

病害対策

気温が上がリ軟弱徒長すると、ウドンコ病が多くなる。茎葉充実と細胞強化を図り、病害対策を行う。

緑化促進に**サンミネーラ 3,000 倍**と**時を越えた贈り物 500 倍**を葉面散布する。

発根促進と酸素供給に**G バランス DF 1 kg/10a**と**発根力 1 kg/10a**を1ヶ月に1回灌水する。

親苗管理

親苗はランナーを多く出すために、花房(花)を摘み着果負担を軽減し、栄養生長させる。

ランナーの発生促進に**笑顔 1,000 倍**(又は**天地の恵み 500 倍**)と**サンミネーラ 10,000 倍**を数回、散布する。

灌注で**天地の恵み 500 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を1~2回、灌注又は散水する。

追肥(液肥)

生育状況、土質、天候によって施用量が異なる。観察して状況に応じて加減する。

天地の恵み(時を越えた贈り物) 200 cc/10a

プロ液肥 1~3 kg/10a

サンミネーラ 50~100 cc/10a

バイオアクト TS 50~70 cc/10a

5~7 日毎に灌水する場合

※生育状況に合わせて増減する。

※サンミネーラの代わりに、シカアップ[®] 100~150 cc、海藻のエキス 50g、K-40 100g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)