

# アスパラガス栽培管理 (H30.4.)

(有) 丸 富

3月前半は朝晩の冷え込みがあり、低温状態が続いたので、収穫量が少なかった。後半は曇天が続いたが、ようやく気温が上がり、収穫量が伸びた。病害虫の発生は低温だったので、少なかった。

## 伸長促進

根が動き出すと、生長に必要な養分を根が吸収する。また、若茎へ直接散布すると、生長点の樹液濃度が上がり、養分吸収が盛んになるので、伸長が促進される。

伸長促進に**天地の恵み 200~300cc/10a**と**サンミネーラ 100cc/10a**を時々灌水する。

養分吸収促進に**笑顔 500倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を時々、若茎に直接散布する。

## 立茎

春芽の収穫は貯蔵養分や地温、養分吸収量(吸収根の量と質)に応じて終え、立茎を開始する。

立茎前に**天地の恵み 0.5~1 kg/10a**(バイオシャイングリーン 2~3 kg)と**サンミネーラ 100cc/10a**を灌水する。

7~8割くらい立茎したら、**時を越えた贈り物 0.5~1 kg/10a**と**サンミネーラ 100cc/10a**を灌水する。

## 養分転流促進

吸収し難いリン酸、カリ、微量元素の転流効率を上げて、若茎の伸びを促す。

養分転流の促進に**サンミネーラ 100cc/10a**と**天地の恵み 300~500cc/10a**を時々灌水する。

## 有害ガス除去

根に有害なガスは根傷みを引き起こし、収穫量を減収させることがある。

有害ガスの除去に**G バランス DF 1 kg/10a 灌水**(30~40日毎に)する。

## 病害対策

立茎後はできる限り通気性を重視し、健全な株を育成する。

病害予防に**ハイプロ**を表面に**3袋/10a**撒布する。健全な株育成に**サンミネーラ 200cc/10a**を灌水する。

## 害虫対策

害虫の発生をできる限り事前対応で抑制する。但し、害虫の発生を確認したら、速やかに防除を行う。

害虫予防に**バイオアクト TS 50~70cc/10a**を時々灌水する。防除時に**バイオアクト TS 3,000倍**を混用する。

## 追肥(液肥)

土壤環境、並びに作型、天気、根の働きによっても増減する。

天地の恵み(又はプロ液肥)	200g(2~3kg)/10a
時を越えた贈り物	200g/10a
サンミネーラ(又はシリカアップ)	50~100g(100cc)/10a
バイオアクト TS	50~70cc/10a

5~7日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壤条件、天候によって加減する。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)