

トマト・ナス栽培管理 (H30.4.)

(有) 丸 富

3月は前半が遠日点で、低温が続き、生育が遅れた。後半は曇天が続いたものの、地温が上昇し、作物が動き始めた。病害虫の発生は灰色かび、ハカビなどが一部で発生した。

発根促進

養分を吸収できる根を作り、収穫量を増やす。

発根促進と酸素供給に **G バランス DF 1 kg / 10a** と **発根力 1 kg (又は天地の恵み 1 kg) / 10a** を1ヶ月に1回、灌水する。

樹勢回復と生育促進に **笑顔 500 倍** と **サンミネーラ 10,000 倍** を数回、葉面散布する。

花の充実促進

栄養生長傾向になると、花芽や花房が充実し難い。花の樹液濃度を上げて、花を充実させる。

花を充実させるために **天地の恵み 200~300 cc / 10a (又は笑顔 100 cc)** と **サンミネーラ 100 cc / 10a** を1ヶ月に2~3回灌水する。

充実した花を咲かせるために **笑顔 1,000 倍 (又は天地の恵み 500 倍)** と **サンミネーラ 5,000 倍** を散布する。

着色促進

できる限り早く収穫して、着果負担を軽減する。

着色促進に **笑顔 1,000 倍 (又は天地の恵み 500 倍)** と **サンミネーラ 5,000 倍** を随時散布する。

病害対策

新月頃に軟弱徒長すると、ハカビ病、ウドンコ病などが盛んになる。日頃から健全な株を育成する。

新陳代謝促進に **K-40 1,000 倍 (又はオリゴファイト 2,000 倍)** と **サンミネーラ 3,000 倍** を葉面散布する。

害虫対策

満月頃は害虫の活動が盛んになるから、害虫の動向を観察して対応する。

事前予防で **時を越えた贈り物 200 cc / 10a** と **バイオアクト TS 50~70 cc / 10a** を5~7日毎に灌水する。

害虫対策に **時を越えた贈り物 1,000 倍** と **バイオアクト TS 2,000 倍** を散布又は防除時に適宜混用する。

追肥(液肥)

生育状況、土質、天候によって施用量が異なる。観察して状況に応じて加減する。

時を越えた贈り物 200 cc / 10a

プロ液肥 500 cc / 10a

サンミネーラ 50~100 cc / 10a

バイオアクト TS 50~70 cc / 10a

5~7日毎に灌水する場合

※生育状況に合わせて増減する。

※サンミネーラの代わりに、シカアップ[®] 100~150 cc、海藻のエキス 50g、K-40 100g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)