

野菜(トマト・ナス)栽培管理 (H30.9.)

(有) 丸 富

8月は高温干ばつで台風が連続到来して、各地で甚大な被害が生じた。盆明け後、少しは涼しくなったものの、酷暑は変わらず干ばつ傾向が続いた。涼しくなって害虫の発生が増え、病害の発生もやや増えた。

活着促進

定植後の活着次第で決まる！と言っても過言ではない。定植後の活着（根張り）がとても大切。

定植前日に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布（又は散水）する。

定植後に**笑顔 2,000 倍(又は天地の恵み 1,000 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を2回灌注する。

害虫対策

満月頃はヨウムシやダニ、アザミマなどが盛んに繁殖する。害虫の動向を注意深く観察する。

害虫対策に**バイオアクト TS 2,000～3,000 倍**を散布又は防除時に適宜混用する。

灌注による害虫対策に**バイオアクト TS 50～70 cc/10a**を5～7日毎に灌水する。

低気圧(酸性雨)対策

東シナ海の西を回ってくる台風や低気圧は、酸性雨を伴うことがあるので注意する。

酸性雨に対する事前対策として**K-40 1,000～2,000 倍**と**サンミネーラ 1,000～2,000 倍**を雨（低気圧）の前後に葉面散布する。

着果促進

遠日点では軟弱徒長しやすく、着果しにくいことがある。特に遠日点の新月頃は着果しにくい。

軟弱徒長予防に**ウルカル(又はスーパーカル)500 倍**と**サンミネーラ 3,000 倍**を散布（又は散水）する。

充実促進に**時を越えた贈り物 500 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

着果促進に**笑顔 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を随時、葉面散布する。

発根促進

定植後、早期に発根促進して、株の充実を図る。根の働きを活発にすると同時に、酸素供給を行う。

発根と細根の維持に**天地の恵み 1,000 倍**と**GバランスDF 5,000 倍**を30～40日毎に灌注する。又は、**天地の恵み 0.5～1 kg/10a**と**GバランスDF 1 kg/10a**を30～40日毎に灌水する。

追肥(液肥)

土質や生育状況、環境、肥培管理によって増減する。

| | |
|-----------|----------------|
| 天地の恵み | 1,000～2,000 倍 |
| サンミネーラ | 5,000～10,000 倍 |
| プロ液肥 | 1,000～2,000 倍 |
| バイオアクト TS | 3,000～5,000 倍 |

5日毎に灌注する場合

※生育状況によって加減する。

※サンミネーラの代わりに、シカアップ[®] 5,000 倍、海藻のエキス 5,000 倍、イロクグリーン(微量要素) 3,000 倍でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)