

いちご栽培管理 (H31.3.)

(有) 丸 富

2月は比較的暖かい日が多く、春の訪れを感じさせる天候だった。日中のハウス内は暑いくらいに気温が上がることもあり、ダニ、アブラムシの発生が多かった。年末年始になり過ぎて、なり疲れして休んだところが多かった。

品質(食味)向上

日長が長くなり、暖かくなると、栄養生長して軟弱徒長する。収穫時に電照を点灯する場合は、その分の点灯時間も考慮して電照管理する。定植後、半年近くなるので微量元素(ミネラル分)は吸収され減少している。灌水時に肥料だけでなく、随時微量元素も同時に補給する。

品質(食味)向上に**時を越えた贈り物 200~300 cc/10a**と**天然ミネラル 200~300 cc/10a**と**サンミネーラ 50~100 cc/10a**を7~10日毎に灌水する。

※ 天然ミネラルの代わりに、海藻のエキス 50 g、スーパーカル雅 500 cc、ウルカル 300 cc でもいい。

病害対策

新月頃、暖かい雨(低気圧)が続くと、軟弱徒長やかび等の病害が多発する。

病害抵抗性強化に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**サンミネーラ 1,000~3,000 倍**を3~5回、葉面散布する。

肥大促進

Kや微量元素を補給して、転流効率を向上させ、肥大効果を引き出す。

肥大促進に**K-40 200g/10a**と**シリカアップ 200 cc/10a**と**サンミネーラ 100 cc/10a**を1ヶ月に2回、灌水する。

ネズミ・害虫対策

近日点の満月頃は、ダニなどが盛んに繁殖するので、害虫の動向に注意する。

ネズミ・害虫の事前対策に**バイオアクト TS**を**50~70 cc/10a**混用する。(5日毎に灌水する場合)

軟弱徒長対策

大きな新葉が出て、徒長し始めると、ますます競い合って徒長する。徒長対策は事前対応が大切。

緑化促進に**ソフトダウン 1,000 倍**(又は**時を越えた贈り物 500 倍**)と**サンミネーラ 3,000 倍**を葉面散布する。

軟果対策に**スーパーカル雅 1ℓ**(又は**ウルカル 500 cc**)/10aと**サンミネーラ 100 cc/10a**を灌水する。

追肥(液肥)

できる限り少量多回数に分けて追肥する。施用量は土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥	3~5ℓ/10a	} 5~7日毎に灌水する場合 ※状況に応じて加減する
天地の恵み(又は時を越えた贈り物)	200~300 cc/10a	
サンミネーラ	50~70 cc/10a	
バイオアクト TS	50~70 cc/10a	

※サンミネーラの代わりに、シリカアップ 100 cc、海藻のエキス 50 g、イログリーン(微量元素) 300 ccでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)