

いちご栽培管理 (H31.4.)

(有) 丸 富

3月は昼夜の寒暖差が激しかったものの、暖かい日が多く、春を実感する天候だった。日中のハウス内は暑いくらいに気温が上がることもあり、ダニ、アブラムシの発生が多かった。

ネズミ・害虫対策

近日点の満月頃は、ダニ、スリップス、アブラムシなどが盛んに繁殖するので、害虫の動向に注意する。

ネズミ・害虫の事前対策に**バイオアクト TS** を **50~70 cc/10a** 灌水する。(3~5日毎に灌水する。)

品質(食味)向上

暖かくなると、開花から収穫までの期間が短くなるので、酸味が増してくる。灌水時に肥料だけでなく、随時微量要素も同時に補給して、品質(食味)の向上を図る。

品質(食味)向上に**時を越えた贈り物 200~300 cc/10a** と**天然ミネラル 200~300 cc/10a** と**サンミネーラ 50~100 cc/10a** を7~10日毎に灌水する。

※天然ミネラルの代わりに、海藻のエキス50g、スーパーカル雅500cc、ウルカル300ccでもいい。

肥大促進

Kや微量要素を補給して、転流効率を上げ、肥大効果を引き出す。

肥大促進に**K-40 200g/10a** と**シリアップ 200 cc/10a** と**サンミネーラ 100 cc/10a** を1ヶ月に2回、灌水する。

親株の病害対策

苗半作と言われるように、健全な親株から苗採りすることが大切。病害が多発する前に、健全な親株の育成を心掛ける。

健全な親株の育成に**ハイプロ 50ℓ(2袋)/m**を培土に混ぜる。

親株に**天地の恵み 500倍** と**サンミネーラ 5,000倍** を1~2回葉面散布、又は灌注する。

軟果対策

暖かくなると、果実が柔らかくなることがあるので、事前の対応が大事。

軟果対策に**スーパーカル雅 1ℓ(又はウルカル 500cc)/10a** と**サンミネーラ 100 cc/10a** を灌水する。

追肥(液肥)

できる限り少量多回数に分けて追肥する。施用量は土質、樹勢、環境などによって加減する。

| | | |
|--------------------------|-----------------------|---|
| プロ液肥 | 1~2ℓ/10a | } 5~7日毎に灌水する場合 ※状況に応じて加減する |
| 時を越えた贈り物(又は天地の恵み) | 200~300 cc/10a | |
| サンミネーラ | 50~70 cc/10a | |
| バイオアクト TS | 50~70 cc/10a | |

※サンミネーラの代わりに、シリアップ 100cc、海藻のエキス50g、天然ミネラル(微量要素) 300ccでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)