

野菜(トマト・ナス)栽培管理 (H31.4.)

(有) 丸 富

3月は昼夜の寒暖差が激しかったものの、暖かい日が多く、春を実感する天候だった。日中のハウス内は暑いくらい気温が上がることもあり、ダニ、アブラムシの発生が多かった。

病害対策

遠日点の新月頃は病害の発生が多くなる。病害に強い健全な株を育成する。

健全な株の育成に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**サンミネーラ 3,000～5,000 倍**を葉面散布する。

品質向上

暖かくなっても光合成能力の高い株を維持し、高品質で多収穫を実現する。

軟果予防に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**と**スーパーカル雅 1,000 倍**を葉面散布する。

高品質多収穫に**笑顔 100 cc(又は天地の恵み 300 cc) / 10a**と**サンミネーラ 100 cc / 10a**を随時灌水する。

着(花)果促進

遠日点下では花(花粉)弱く、着(花)果が悪い。光合成を促進して、着(花)果を促進する。

着(花)果促進に**笑顔 1,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を3～5回連続で、葉面散布する。

果実や茎葉の充実促進に**時を越えた贈り物 500 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。

発根促進

収穫量は根の量(根域の大きさ)と質(直根と細根のバランス)によって決まる。

活力ある根の維持に**天地の恵み(又は発根力) 1,000 倍**と**GバランスDF 5,000 倍**を30日毎に灌注する。

灌水で**天地の恵み(又は発根力) 500 cc / 10a**と**GバランスDF 0.5 kg / 10a**を15～20日毎に灌水する。

害虫対策

暖かくなると、害虫は活発に活動する。ハウス周辺からハウス内へ侵入するので、観察して事前対応する。

害虫のハウス内への飛び込みや繁殖の予防に**バイオアクト TS 2,000～3,000 倍**を散布する。

害虫の事前対応に**バイオアクト TS 50～70 cc / 10a**を5～7日毎に灌水する。

追肥(液肥)

土質や生育状況、環境、肥培管理によって増減する。

天地の恵み 200～500g / 10a

サンミネーラ 50～100g / 10a

プロ液肥 2～3 kg / 10a

バイオアクト TS 50～70 cc / 10a

5日毎に灌注する場合

※生育状況によって加減する。

※サンミネーラの代わりに、シカアップ 100～200 cc、海藻のエキス 50 cc、天然ミネラル(微量要素) 300 ccでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)