

アスパラガス栽培管理(H31.5.)

(有) 丸 富

4月は寒暖差が激しかったものの、雨が少なく、初夏を感じさせる暑さだった。日中のハウス内は暑い位に気温が上がり、早くも夏の高温障害を心配するような陽気になった。

緑化促進

立茎が終わったら、親茎(地上茎)の緑化を促進し、過繁茂にならないよう茎葉の充実を図る。
充実緑化促進に**時を越えた贈り物 1,000 倍(又は、天然ミネラル 1,000 倍)**と**サンミネーラ 5,000 倍**を2~3回、葉面散布する。

微量要素補給

健全な株の育成には、微量要素など必須養分を満たす必要がある。
微量要素補給に**天然ミネラル(又は、ウルカル)200~300 cc/10a**を随時、灌水する。

害虫対策

玉ねぎや麦などハウス周辺の作物からハウス内へ害虫が飛び込むので、被害を受ける前に対応する。
害虫対策に**バイオアクト TS 50~70cc/10a**を5~7日毎に灌水する。

病害対策

遠日点になると、かび病や斑点病などの病害が増えやすくなる。健全な株の育成で乗り越える。
健全な株の育成と微生物の働きの強化に**時を越えた贈り物(又は、天地の恵み) 500~1,000 倍**と**サンミネーラ 3,000 倍**を葉面散布する。(防除時混用はサンミネーラ 10,000 倍)

品質向上

遠日点では根から養分が吸収し難いので、養分転流効率を上げるか、又は葉面散布で補給する。
曲がり、偏平対策に**スーパーカル雅 300~500cc(又は、ウルカル 200~300cc)/10a**と**サンミネーラ 100 cc/10a(又は、シリカアップ 200 cc)**を灌水する。

夏芽発生前に

夏芽発生前の親茎ピンチ後は早く樹勢回復するよう、数回葉面散布を続け、若茎の発生を促す。
ピンチ後に**時を越えた贈り物 500 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を2~3回葉面散布、又は散水する。

追肥(液肥)

土壤環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥	2~3 kg/10a	} 7~10 日ごとに灌水する場合 ※収穫量や土壤条件、天候によって 加減する。
時を越えた贈り物	200~300 cc/10a	
サンミネーラ(又はシリカアップ)	50 cc(100cc)/10a	
ストップ-雅(又はバイオアクト TS)	200cc(70cc)/10a	

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)