

アスパラガス栽培管理(H31.6.)

(有) 丸 富

5月は雨が少なく、春を越えて真夏のような暑さになった。スリップスが多く発生し、若茎に影響が出た。

湿(水)害対策

近年、梅雨時期にゲリラ豪雨、集中豪雨による災害が多くなっている。排水対策を万全に準備する。
災害後は、速やかな樹勢回復に**笑顔(又は、時を越えた贈り物)1,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を2~3回、葉面散布(又は、防除時に混用)する。

害虫対策

ハウス周辺からハウス内へ害虫が飛び込む場合が多いので、できる限り侵入を妨げるように対応する。
害虫対策に**バイオアクト TS 50~70cc/10a**を3~5日毎に灌水する。

品質向上

根から養分が吸収し難い時は、養分の転流効率を上げるか、又は葉面散布で養分を補給する。
曲がり、偏平対策に**スーパーカル雅 300~500cc(又は、ウルカル 200~300cc)/10a**と**サンミネーラ 100cc/10a(又は、シリカアップ 200cc)**を灌水する。

緑化促進

追加立茎する場合は緑化を促進し、過繁茂にならないよう茎葉の充実を図る。
充実緑化促進に**時を越えた贈り物 1,000倍(又は、天然ミネラル 1,000倍)**と**サンミネーラ 3,000倍**を2~3回、葉面散布する。

微量要素補給

健全な株の育成には、微量要素など必須養分を満たす必要がある。
微量要素補給に**天然ミネラル(又は、ウルカル)200~300cc/10a**を適宜、灌水(又は、散水)する。

病害対策

遠日点になると、かび病や斑点病などの病害が増えやすい。健全な株の育成で乗り越える。
健全な株の育成と微生物の働きの強化に**時を越えた贈り物(又は、天地の恵み) 500~1,000倍**と**サンミネーラ 3,000倍**を葉面散布する。(防除時混用はサンミネーラ 10,000倍)

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥	2~3 kg/10a	} 5~7日ごとに灌水する場合 ※収穫量や土壌条件、天候によって 加減する。
時を越えた贈り物	200~300 cc/10a	
サンミネーラ(又はシリカアップ)	50 cc(100cc)/10a	
ストップアーク(又はバイオアクト TS)	200cc(70cc)/10a	

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)