

アスパラガス栽培管理(R1.9.)

(有) 丸 富

8 月前半は猛暑に見舞われ、高温障害で品質低下が著しく、大きなダメージを受けた。また、台風や集中豪雨に見舞われた。後半は秋を感じる暑さに落ち着いた。病虫害は猛暑でやや落ち着いた状態だった。

品質向上

微量要素などは細根で吸収するから、地温が下がり、根が動き出すとバランス良く吸収できる。
曲がり、偏平対策に**スーパーカル雅 300～500cc(又は、ウルカル 200～300cc)／10a** と**サンミネーラ 50～100 cc／10a(又は、シリアップ 150～200 cc)**を灌水する。

害虫対策

害虫のハウス内への飛び込みを妨げる防虫ネットや害虫が嫌う忌避剤などで、事前対応で予防する。
害虫対策に**バイオアクト TS 50～70cc／10a**を3～5日毎に灌水(散水)する。

樹勢回復

樹勢が低下している株は、光合成を促進して、茎葉の充実を図る。
樹勢回復に**笑顔 1,000 倍(又は、天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 3,000 倍**を回復するまで、3～4回連続で、葉面散布する。

湿(水)害対策

低気圧を伴うゲリラ豪雨、集中豪雨の被害にあったら、早急に樹勢回復を図るよう対応する。
低気圧の通過前に**K-40 2,000 倍**と**サンミネーラ 3,000 倍**を葉面散布する。
被害後に**天地の恵み(又は、発根力)1,000 倍**と**GバランスDF 5,000 倍**を灌注、又は散水する。

貯蔵養分対策

秋になれば、来年の春芽の形成が始まる。徐々に、来春の貯蔵養分が蓄積するよう管理する。
貯蔵養分蓄積に**サンミネーラ 100～200 cc／10a**を灌水する。又は**サンミネーラ 5,000 倍**を散布する。

病害対策

病害のほとんどが通気性不足や薬害による樹勢低下である。健全な株の育成を心がける。
通気性強化と樹勢回復に**時を越えた贈り物 500～1,000 倍**と**サンミネーラ 3,000 倍**を葉面散布する。

追肥(液肥)

土壤環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥	2～3 kg／10a	} 5～7 日ごとに灌水する場合 ※収穫量や土壤条件、天候によって 加減する。
時を越えた贈り物	200～300 cc／10a	
サンミネーラ(又はシリアップ)	50 cc(100cc)／10a	
ストップパ-雅(又はバイオアクト TS)	200cc(70cc)／10a	

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)