

アスパラガス栽培管理(R2.1.)

(有) 丸 富

12月是比较的气温が高い日が多かった。そのため、低温に遭遇する時間が短く、貯蔵養分の蓄積が少なかったと思われる。保温後の低温に注意が必要。

土づくり

アスパラガスは畑の豚と言うほど、土の養分を吸収するので、土づくりが大切。必要な養分を適量施すことが大事。必要以上に施しても問題は出ないが、もったいない。土壌分析などを指標として、費用対効果を考え、施肥設計する。

有害ガス除去

蒸し込む際に高温になるので、堆肥などが未熟な場合、有害ガスで萌芽を抑制することがある。
有害ガス除去に **G バランス DF 1 kg/10a** を灌水する。(又は **G バランス細粒 10 kg/10a** 撒布する)

萌芽促進

蒸し込み後、できる限りスムーズに萌芽するよう、事前対応で萌芽を促す。
蒸し込み前に **バイオシャイングリーン 3 kg(又は天地の恵み 1 kg)/10a** と **サンミネーラ 50 cc/10a** を灌水する。
若茎の生長促進に **笑顔 1,000 倍** と **サンミネーラ 10,000 倍cc/10a** を適宜、葉面散布する。

病害対策

昨年の水害などの影響で病害の発生がとても多いので、土壌改良時に病害対策を施す。
病害抵抗性の強化に **ハイプロ 5~10 袋/10a**、又は病害対策の **微生物資材** を土壌改良時に投入し、病害の拡大を事前に予防する。
※資材の投入量は資材の種類、投入方法、圃場、土質によって異なるので、詳しくは地域の技術員にご相談ください。

害虫対策

害虫のハウス内での繁殖の予防策として、害虫が嫌う忌避剤などで、事前対応する。
害虫の繁殖対策に **バイオアクト TS 50~70cc/10a** を 5~7 日毎に灌水(散水)する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥	0.5~1 kg/10a	} 5~10 日ごとに灌水する場合 ※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。
時を越えた贈り物	50~100 cc/10a	
サンミネーラ(又はシリカアップ)	50 cc(100cc)/10a	
ストップヤ(又はバイオアクト TS)	100cc(50cc)/10a	

ご注文やお問い合わせは、**有限会社 丸 富** 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)