

# アスパラガス栽培管理(R2.3.)

(有) 丸 富

2月も比較的暖かかったが、時折、寒気に見舞われ、曇天や低気圧により荒天が多かった。萌芽は進んだが、若茎が細いため収穫量は伸び悩んだ。害虫は多く、早くもスリップスが一部で発生した。

## 害虫対策

近日点では害虫の発生が多いので、害虫が嫌う忌避剤などで、事前対応する。  
害虫対策に**バイオアクト TS 50~70cc/10a**を5~7日毎に灌水(散水)する。

## 伸長促進

地温が18℃以上になると、若茎の伸長が促進して、収穫量が增大する。  
若茎の生長促進に**笑顔 1,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍/10a**を(若茎に直接)散布する。  
転流促進に**天地の恵み 200~300cc(又は笑顔 100cc)/10a**と**サンミネーラ 50cc/10a**を散水(灌注)する。

## 品質向上

曲がりや偏平は養分バランスの乱れによって生じる。日頃から養分バランスを考えて、肥培管理する。  
品質向上に**天然ミネラル 200cc/10a**と**酸カル 100cc/10a**と**サンミネーラ 50cc/10a**を灌水する。

## 有害ガス除去

未熟な有機質肥料や堆肥など分解する際に発生する有害ガスが、萌芽を抑制することがある。  
有害ガス除去に**Gバランス DF 1kg/10a**を灌水する。(又は**Gバランス細粒 10kg/10a**撒布する)

## 立茎前に

立茎しやすいよう、できる限り株の勢いがある時に立茎する。新月頃に立茎すると、勢いよく伸長する。  
立茎前に**バイオシャイングリーン 3kg(又は天地の恵み 1kg)/10a**と**サンミネーラ 100cc/10a**を2回、灌水する。

## 追肥(液肥)

土壤環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

<b>プロ液肥</b>	<b>2~3ℓ/10a</b>
<b>時を越えた贈り物</b>	<b>100~200cc/10a</b>
<b>サンミネーラ(又はシリカアップ)</b>	<b>50cc(100cc)/10a</b>
<b>ストップナー雅(又はバイオアクト TS)</b>	<b>100cc(50cc)/10a</b>

**5~10日ごとに灌水する場合**

※収穫量や土壤条件、天候によって加減する。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

**FAX 0942-65-1091 (24時間受付)** 携帯 090-3328-7603 (富松まで)