

いちご栽培管理 (R2.6.)

(有) 丸 富

5月は全体的に風が吹く日が多く、気温も激変して、朝晩は冷たく、収穫には適した天候だった。しかし、日中は夏のような暑さで、前線を伴った低気圧が通過する際、激しい雨が降った。ランナーの発生が少なかった。

ランナーの発生促進

ランナーの発生が少ない時は、新月頃に液肥の灌注と葉面散布で、ランナーの発生を促進する。

ランナーの発生促進に**天地の恵み 500倍(又はバイオシャイニンググリーン 500倍)**と**サンミネーラ(又はシリカアップ) 10,000倍**を数回、散水(灌注)する。

活着促進

挿しポットやすけポットで、活着が早いように、苗挿しや苗押さえの後に散水、又は灌注で活着促進する。

活着促進に**笑顔 1,000~2,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を散水又は灌注する。

苗の病害対策

健全な苗の育成で病害を減少する。

健全苗育成に、微生物の活性を促進する**天地の恵み 1,000倍**と**天然ミネラル 1,000倍**をポット土に散水(灌注)する。防除時に**天地の恵み(又は笑顔)1,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を混用する。

害虫対策

高温になると、ダニ、スリップス、その他害虫が繁殖拡大する。事前の忌避対策と予防が大切。

害虫対策は事前に忌避で**バイオアクトTS 50~70 cc/10a**を3~5日毎に灌水する。

徒長対策

育苗環境で異なるが、苗が密状態になっていると軟弱徒長する。株間を広げて、通気性を確保する。

徒長対策に**酸カル 1,000倍**と**サンミネーラ 5,000倍**と**シリカアップ 5,000倍**を灌注、又は散水する。

追肥(液肥)

少量多回数で灌水、散水する。施用量は土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥	500~1,000倍	} 5~7日毎に灌水する場合 ※状況に応じて加減する
時を越えた贈り物(又は天地の恵み)	1,000~2,000倍	
サンミネーラ	5,000~10,000倍	
バイオアクトTS	5,000~10,000倍	

※サンミネーラの代わりにシリカアップ 100~150 cc、天然ミネラル 150~200 cc、海藻のエキス 50~100 g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)