

アスパラガス栽培管理(R2.7.)

(有) 丸 富

6 月は空梅雨傾向で風が強く吹くことが多く、雨が降る時は激しく降った。しかし、気温は夏のような暑さになったが、病害虫の発生は比較的少なかった。収穫量は増えたが、規格外品が多かった。

緑化促進

梅雨の日照不足を補い、光合成を促進するよう、茎葉の緑化を促す。

緑化促進に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**天然ミネラル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布する。

転流促進に**シリカアップ 100cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を液肥灌水時に混用する。

品質向上

曲がりや偏平が多く生じる場合は、日頃からの養分バランスを改善し、効率的な肥培管理を行う。

品質向上に**天然ミネラル 200 cc/10a**と**酸カル 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を灌水する。

樹勢回復

近年、大雨による冠水が多くなっている。被害があったら、できる限り早く、樹勢回復を図る。

樹勢回復するまで**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

発根促進

収穫が長くなると、徐々に根が傷んでくる。定期的に発根と吸収根の維持を行う。

発根と吸収根の維持に**G バランス DF 1 kg/10a**と**発根力 1 ℓ(又は天地の恵み 0.5 ℓ)/10a**を、30~40 日ごとに灌水する。

害虫対策

防除だけで抑えにくい時は、害虫が嫌う忌避剤などと併用して対応する。また、樹勢低下すると、ダニが繁殖しやすいので、できる限り樹勢を維持する。

害虫対策に**バイオアクト TS 50~70cc/10a**又は**ストッパー-雅 200cc/10a**を 3~5 日毎に灌水する。

病害対策

梅雨時期は通気性が良いように、できる限り換気をして、天候に応じたハウス内環境を整える。

健全な株の育成に**サンミネーラ 2,000 倍**と**天然ミネラル 2,000 倍**を 7~10 日毎に葉面散布する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 3~5 ℓ/10a

時を越えた贈り物 100~200 cc/10a

サンミネーラ(又はシリカアップ) 50 cc(100cc)/10a

ストッパー-雅(又はバイオアクト TS) 100cc(50cc)/10a

5~10 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって
加減する。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)