

アスパラガス栽培管理(R2.8.)

(有) 丸 富

7月には梅雨が長引き各地で豪雨、冠水被害が発生した。その他、突風、竜巻など様々な被害が発生した。農作物は長雨日照不足により、生長が鈍く、軟弱徒長傾向で、病害虫の発生が多かった。

樹勢回復

梅雨の長雨により各地で水害や根傷みが多かったため、できる限り早く樹勢回復を図る。
樹勢回復するまで**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。

緑化促進

日照不足を補い、光合成を促進して、茎葉の緑化・充実を図る。梅雨明け後の樹勢低下を予防する。
緑化促進に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**天然ミネラル 2,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を散布する。
転流促進に**シリカアップ 100cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を液肥灌水時に混用する。

病害対策

梅雨明け後は高温多湿により株の消耗が激しくなる。できる限り換気をして、ハウス内環境を整える。
窒素消化促進に**サンミネーラ 2,000 倍**と**天然ミネラル 2,000 倍**を7~10日毎に葉面散布する。

酸素供給

梅雨の長雨で根が傷んでいるところが多い。高温時は土中の溶存酸素量が低下するので、定期的に酸素供給を行い、発根と吸収根の維持を行う。
発根と吸収根の維持に**G バランス DF 1 kg/10a**と**発根力 1ℓ(又は天地の恵み 0.5ℓ)/10a**を、30~40日ごとに灌水する。

品質向上

日照不足下では根の働きが低下し、微量元素の養分吸収も低下する。効率的な肥培管理を行う。
品質向上に**天然ミネラル 200 cc/10a**と**酸カル 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を灌水する。

害虫対策

害虫が嫌う忌避剤などを併用して、できる限り樹勢を維持し、ダニなどの繁殖を抑制する。
害虫対策に**バイオアクト TS 50~100cc/10a**又は**ストップパー雅 200cc/10a**を3~5日毎に灌水する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥	3~5ℓ/10a	} 5~10日ごとに灌水する場合 ※収穫量や土壌条件、天候によって 加減する。
時を越えた贈り物	100~200 cc/10a	
サンミネーラ(又はシリカアップ)	50 cc(100cc)/10a	
ストップパー雅(又はバイオアクト TS)	100cc(50cc)/10a	

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)