

アスパラガス栽培管理(R3.3.)

(有) 丸 富

2月前半は天気が不安定で、冷え込みが厳しく地温が上がらず、収穫量が少なかった。後半は暖かい日が多く、地温が上がり収穫量が増えた。寒暖の差が激しい天候だった。

品質向上に

若茎を収穫し続けると、徐々に養分を消耗し、偏平や曲がりが多くなる。

品質向上に**酸カル 1,000 倍**と**天然ミネラル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

灌水・散水で**酸カル 200 cc/10a**と**天然ミネラル 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を施用する。

伸長促進

収穫し続けると、若茎の糖度が徐々に下がり、生長速度が落ちてくる。

伸長促進に**バイオシャイングリーン 3 kg(又は天地の恵み 1 kg)/10a**と**サンミネーラ 100g/10a**を灌水する。

灌水と同時に**笑顔 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を1~3日毎に数回、葉面散布する。

有害ガスの除去

有機質肥料や未熟な堆肥が分解する際に発生する有害ガスが根の働きを妨げることがある。

有害ガス除去に**G バランス DF 1 kg/10a**を灌水する。(30~40日間有害ガスを除去する。)

害虫対策

ハウス周辺環境の変化や強風により、害虫がハウス周辺から飛び込むことがあるので、注意する。

害虫防除前に**バイオアクト TS 50~100cc/10a**を灌水し、害虫を地上部へ追い出して、防除する。

害虫防除時に**バイオアクト TS 2,000~3,000 倍**又は**ストッパー-雅 1,000 倍**を混用散布する。

立茎前に

春芽を適量収穫した後、株に勢いを残して立茎を行う。

立茎前に**バイオシャイングリーン 3 kg(又は天地の恵み 1 kg)/10a**と**サンミネーラ 100g/10a**を灌水する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 2~3ℓ/10a

時を越えた贈り物 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50 cc/10a

ストッパー-雅(又はバイオアクト TS) 100cc(50cc)/10a

5~10日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネーラの代わりにシカアップ 100~150 cc、天然ミネラル 100~200 cc、海藻のエキス 50gでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)