

アスパラガス栽培管理(R3.4.)

(有) 丸 富

3月は比較的雨が少なく、温暖で安定した天気だった。時折、冷え込みや強風をもたらす低気圧の通過があった。気温が上昇して、ハウス周辺でスリップス、アブラムシなど害虫の発生が盛んになった。

展葉促進

立茎後、茎葉の伸長を促進して、展葉、緑化が早まれば、夏芽の収穫がやや促進する。

伸長促進に**バイオシャイングリーン 3 kg(又は天地の恵み 1 kg) / 10a**と**サンミネーラ 100g / 10a**を灌水する。

展葉、緑化に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を数回、葉面散布する。

摘芯前後に

夏芽を収穫する前に、株の樹勢回復を行う。

摘芯前後に**天地の恵み 0.5 kg(又は発根力 1 kg) / 10a**と**サンミネーラ 100g / 10a**を灌水する。

摘芯後に**時を越えた贈り物 500~1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を数回、葉面散布する。

品質向上に

若茎を収穫し続けると、収穫量に応じて養分を消耗する。

品質向上に**酸カル 1,000 倍**と**天然ミネラル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を時々散布する。

灌水・散水で**酸カル 200 cc / 10a**と**天然ミネラル 100 cc / 10a**と**サンミネーラ 50 cc / 10a**を施用する。

発根促進

収穫量に応じて、根は傷んでいくので、新しい根を育成する。

発根促進と細根維持に**G バランス DF 1 kg / 10a**と**発根力 1 kg(又は天地の恵み 0.5 kg) / 10a**を灌水する。(30~45 日毎に施用)

害虫対策

ハウス周辺環境の変化や強風により、害虫がハウス周辺から飛び込むことがある。

害虫防除前に**バイオアクト TS 50~100cc / 10a**を灌水し、害虫を地上部へ追い出して、防除する。

害虫防除時に**バイオアクト TS 2,000~3,000 倍**又は**スツパー-雅 1,000 倍**を混用散布する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 2~3 ℓ / 10a

時を越えた贈り物 100~200 cc / 10a

サンミネーラ 50 cc / 10a

スツパー-雅(又はバイオアクト TS) 100cc(50cc) / 10a

5~10 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって
加減する。

※サンミネーラの代わりにシリアップ 100~150 cc、天然ミネラル 100~200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)