

いちご栽培管理 (R3.3.)

(有) 丸 富

2 月前半は天気が不安定で、冷え込みが厳しく着色が遅かった。後半は暖かい日が多く、着色が進み、収穫量が増えた。寒暖の差が激しい天候だった。地域によって差はあるが、一部でダニ、スリップス、アブラムシが発生した。

軟果対策

暖くなると、果実が柔らかく果皮に傷が入りやすくなる。

軟果対策に**酸カル 1,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を数回、葉面散布する。(防除時に混用可)

灌水時に**酸カル 100~200 cc/10a**と**サンミネーラ 50~100 cc/10a**を施用する。(液肥と混用可)

徒長抑制

春先は気温が上がり、日長も長くなるので、栄養生長傾向で徒長する。徒長した茎葉は縮めることはできない。事前に徒長しないよう抑制する。

徒長抑制に**時を越えた贈り物 500 倍(又は酸カル 500 倍)**と**サンミネーラ 3,000 倍**を数回、葉面散布する。

病害対策

低気圧や前線の通過で暖かい雨が降ると、灰色かびなど病害の発生が多くなる。

健全な株の育成に**天然ミネラル 2,000 倍**と**酸カル 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

防除時に**天然ミネラル 3,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を混用する。

害虫対策

暖くなると、害虫の繁殖が盛んになるので、要注意。ハウス周辺の環境変化による飛び込みに注意。

事前対策として**バイオアクトTS 50~70 cc/10a**を3~5日毎に散水、又は散布する。

事前の害虫対策として**バイオアクトTS 2,000~3,000 倍**を防除時に混用散布する。

親株対策

ランナーが出始めた後、遅霜など低温被害に遭うと、樹勢回復に時間がかかるので、注意する。

防除時に**天地の恵み 1,000 倍(又は笑顔 2,000 倍)/10a**と**サンミネーラ 10,000 倍**を混用する。

追肥(液肥)

少量多回数で灌水、散水する。施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥 2~3ℓ/10a

時を越えた贈り物 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50~70 cc/10a

バイオアクトTS 50~70 cc/10a

5~7日毎に灌水する場合

※状況に応じて加減する

※サンミネーラの代わりにシリアップ 100~150 cc、天然ミネラル 100~200 cc、海藻のエキス 50gでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)