

いちご栽培管理 (R3.4.)

(有) 丸 富

3月は比較的雨が少なく、温暖で安定した天気だった。時折、冷え込みや強風をもたらす低気圧の通過があり、一部でかびなど病害が発生した。地域、品種によって異なるが、一部でダニ、スリップス、アブラムシが発生した。

軟果対策

暑いくらいに気温が上がり、果皮や果実が柔らかくなる。

軟果対策に**酸カル 1,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を数回、葉面散布する。(防除時に混用可)

灌水時に**酸カル 100~200 cc/10a**と**サンミネーラ 50~100 cc/10a**を施用する。(液肥と混用可)

徒長抑制

徒長してしまった茎葉は縮めることはできないが、事前に徒長しないよう抑制する。

徒長抑制に**時を越えた贈り物 500 倍(又は酸カル 500 倍)**と**サンミネーラ 3,000 倍**を数回、葉面散布する。

病害対策

低気圧や前線の通過で気圧が下がると、窒素過多になり灰色かびなど病害の発生が多くなる。

窒素消化促進に**天然ミネラル 2,000 倍**と**酸カル 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

防除時に**天然ミネラル 3,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を混用する。

害虫対策

近日点になると、害虫の繁殖が盛んになるので、要注意。ハウス周辺の環境変化による害虫の飛び込みに注意。

事前対策として**バイオアクトTS 50~70 cc/10a**を3~5日毎に散水、又は散布する。

事前の害虫対策として**バイオアクトTS 2,000~3,000 倍**を防除時に混用散布する。

親株対策

遅霜など低温被害に遭うと、樹勢回復に時間がかかるので、充実した株づくりを行う。

防除時に**天地の恵み 1,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を混用する。

追肥(液肥)

少量多回数で灌水、散水する。施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥 0.5~1ℓ/10a

時を越えた贈り物(又は酸カル) 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50~70 cc/10a

バイオアクトTS 50~70 cc/10a

5~7日毎に灌水する場合

※状況に応じて加減する

※サンミネーラの代わりにシカアップ 100~150 cc、天然ミネラル 100~200 cc、海藻のエキス 50gでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)