

アスパラガス栽培管理(R3.5.)

(有) 丸 富

4月は日格差が大きく、風が強い日が多く、夏日もあり、干ばつ傾向で2, 3週間前倒しの天候だった。時折、黄砂も飛来した。一部でスリップスやアブラムシなど害虫が発生した。

摘芯前後に

夏芽を収穫する前に、株の樹勢回復を行う。

摘芯前後に**天地の恵み 0.5 kg(又は発根力 1 kg) / 10a** と**サンミネーラ 100g / 10a** を灌水する。

摘芯後に**時を越えた贈り物 500~1,000 倍** と**サンミネーラ 10,000 倍** を散布する。(防除時、混用可)

害虫対策

近日点になると、害虫の発生が多くなる。また、強風によりハウス周辺の害虫が飛び込むことがある。

害虫防除前に**バイオアクト TS 50~100cc / 10a** を灌水し、害虫を地上部へ追い出して、防除する。

害虫防除時に**バイオアクト TS 2,000~3,000 倍** 又は**ストップ-雅 1,000 倍** を混用散布する。

品質向上に

若茎を収穫し続けると、収穫量に応じて養分を消耗する。

品質向上に**酸カル 1,000 倍** と**天然ミネラル 2,000 倍** と**サンミネーラ 10,000 倍** を散布する。

灌注・散水で**酸カル 200 cc / 10a** と**天然ミネラル 100 cc / 10a** と**サンミネーラ 50 cc / 10a** を施用する。

夏芽促進

夏芽の収穫が始まったら、若茎の伸長を促進して、収穫量を増やす。

伸長促進に**バイオシャイングリーン 3 kg(又は天地の恵み 1 kg) / 10a** と**サンミネーラ 100g / 10a** を灌水する。

緑化促進に**天然ミネラル 2,000 倍(又は酸カル 1,000 倍)** と**サンミネーラ 5,000 倍** を葉面散布する。

発根促進

地温が上がると、土壌中の溶存酸素量が減少するので、発根に必要な酸素を供給する。

発根促進と細根維持に**G バランス DF 1 kg / 10a** と**発根力 1 kg(又は天地の恵み 0.5 kg) / 10a** を灌水する。(30~45 日毎に施用)

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 2~3 ℓ / 10a

時を越えた贈り物 100~200 cc / 10a

サンミネーラ 50 cc / 10a

ストップ-雅(又はバイオアクト TS) 100cc(50cc) / 10a

5~10 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネーラの代わりにシリアップ 100~150 cc、天然ミネラル 100~200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)