

いちご栽培管理 (R3.5.)

(有) 丸 富

4月は日格差が大きく、風が強い日が多く、夏日もあり、干ばつ傾向で2, 3週間前倒しの天候だった。時折、黄砂も飛来した。品種によって異なるが、なり疲れや不受精果があった。一部でスリップスなど害虫が発生した。

親株対策

近日点で生殖生長傾向になると、花芽分化しやすいので、ランナーの発生が少ない。肥料切れしないように親苗の肥培管理を行う。

防除時に**天地の恵み 1,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を混用する。

ランナーの発生が悪い時は**天地の恵み(又は発根力)1,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を灌注する。

害虫対策

近日点では害虫の発生が盛んになるので、要注意。ハウス周辺の環境変化による害虫の飛び込みに注意。

事前対策として**バイオアクトTS 50~70 cc/10a**を3~5日毎に散水、又は散布する。

事前の害虫対策として**バイオアクトTS 2,000~3,000倍**を防除時に混用散布する。

軟果対策

気温が上がると、果皮や果実が柔らかくなる。

軟果対策に**酸カル 1,000倍**と**サンミネーラ 5,000倍**を葉面散布する。(防除時に混用可)

灌水時に**酸カル 100~200 cc/10a**と**サンミネーラ 50~100 cc/10a**を施用する。(液肥と混用可)

徒長抑制

長日期の若干の徒長はやむをえないが、事前対応で徒長をできる限り抑制する。

徒長抑制に**時を越えた贈り物 500倍(又は酸カル 500倍)**と**サンミネーラ 3,000倍**を葉面散布する。

病害対策

病害は菌が適温適湿域で盛んに繁殖して発生する。

窒素消化と抵抗性強化に**天然ミネラル 2,000倍**と**酸カル 1,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を散布する。

防除時に**天然ミネラル 3,000倍**と**酸カル 2,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を混用する。

追肥(液肥)

少量多回数で灌水、散水する。施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥 0.5~1ℓ/10a

時を越えた贈り物(又は酸カル) 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50~70 cc/10a

バイオアクトTS 50~70 cc/10a

5~7日毎に灌水する場合
※状況に応じて加減する

※サンミネーラの代わりにシカアップ[®] 100~150 cc、天然ミネラル 100~200 cc、海藻のエキス 50gでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)