

# いちご栽培管理 (R3.6.)

(有) 丸 富

5月は風が強い日が多く、黄砂の飛来もあった。各地でスリップスなど害虫が多く発生し、早く終わった。今年は梅雨入りがかなり早く、一時的に曇雨天が続いた。下旬は一転して天気が続き、夏日が続いた。

## ランナー発生促進

5月下旬から6月上旬になると、ランナーの発生が徐々に多くなる。新月近くになると、ランナーが多く出る。防除時に**笑顔 2,000倍(又は天地の恵み 1,000倍)**と**サンミネーラ 10,000倍**を混用散布する。灌水時に**天地の恵み 200~300 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を混用施用する。

## 徒長抑制

ランナーを多く発生させるためには、若干の軟弱徒長はやむをえないが、必要以上の徒長を抑える。軟弱徒長抑制に**時を越えた贈り物(又は酸カル、天然ミネラル)2,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を散布する。

## 親株対策

親株に花や実が付くと、ランナーの発生が少なくなる。花芽分化しないよう、親苗の肥培管理を行う。防除時に**笑顔 2,000倍(又は天地の恵み 1,000倍)**と**サンミネーラ 10,000倍**を混用する。ランナーの発生が悪い時は**天地の恵み(又は発根力)500倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を灌注する。

## 害虫対策

近日点では害虫の発生が盛んになるので、要注意。苗床周辺の環境変化による害虫の飛び込みに注意。事前対策として**バイオアクトTS 50~70 cc/10a**を3~5日毎に散水、又は散布する。事前の害虫対策として**バイオアクトTS 2,000~3,000倍**を防除時に混用散布する。

## 病害対策

適温適湿の環境下で、硝酸態窒素が過多の時に、病害(菌)が盛んに繁殖・発生する。窒素消化と抵抗性強化に**天然ミネラル 2,000倍**と**酸カル 1,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を散布する。防除時に**天然ミネラル 3,000倍**と**酸カル 2,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を混用する。

## 追肥(液肥)

少量多回数で灌水、散水する。施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥	0.5~1ℓ/10a	} 5~7日毎に灌水する場合 ※状況に応じて加減する
時を越えた贈り物(又は酸カル)	100~200 cc/10a	
サンミネーラ	50~70 cc/10a	
バイオアクトTS	50~70 cc/10a	

※サンミネーラの代わりにシカアップ 100~150 cc、天然ミネラル 100~200 cc、海藻のエキス 50gでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)