

# アスパラガス栽培管理(R3.6.)

(有) 丸 富

5月は風が強い日が多く、黄砂の飛来もあった。各地でスリップス、アブラムシ、コナジラミなど害虫が多く発生した。今年梅雨入りがかなり早く、一時的に曇雨天が続いた。下旬は一転して天気続き、夏日が続いた。

## 害虫対策

近日点になると、害虫の発生が多くなる。また、風によりハウス周辺の害虫が飛び込むことがある。害虫防除前に**バイオアクト TS 50～100cc/10a**を灌水し、害虫を土中から追い出す。害虫防除時に**バイオアクト TS 2,000～3,000倍(又はストッパー雅 1,000倍)**を散布する。

## 品質向上に

収穫量に応じて養分を消費する。収穫量が多い場合は施用量・施用回数を増やす。品質向上に**酸カル 1,000倍**と**天然ミネラル 2,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を散布する。灌水・散水で**酸カル 200 cc/10a**と**天然ミネラル 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を施用する。

## 夏芽促進

若茎の伸長を促進して、収穫量を増やす。伸長促進に**バイオシャイングリーン 3 kg(又は天地の恵み 1 kg)/10a**と**サンミネーラ 100g/10a**を灌水する。緑化促進に**天然ミネラル 2,000倍(又は酸カル 1,000倍)**と**サンミネーラ 5,000倍**を葉面散布する。

## 通気性の確保

茎葉が混み合うと病害の発生や減収につながるため、病虫害と増収の対策として通気性確保が大事。茎葉の抑制に**時を越えた贈り物 0.3 kg(又は発根力 1 kg)/10a**と**サンミネーラ 50g/10a**を灌水する。二次葉、ぎ葉の抑制に**時を越えた贈り物 500倍(酸カル 1,000倍)**と**サンミネーラ 5,000倍**を散布する。

## 発根促進

日頃から発根に必要な酸素を供給する。吸収根の働きを活発に維持する。発根促進と細根維持に**G バランス DF 0.5 kg/10a**と**発根力 0.5 kg(又は天地の恵み 0.3 kg)/10a**を灌水する。(15～20日毎に施用)

## 追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥	5～10ℓ/10a	} 5～10日ごとに灌水する場合 ※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。
時を越えた贈り物	100～200 cc/10a	
サンミネーラ	50 cc/10a	
ストッパー雅(又はバイオアクト TS)	100cc(50cc)/10a	

※サンミネーラの代わりにシリアップ 100～150 cc、天然ミネラル 100～200 cc、海藻のエキス 50gでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)