

アスパラガス栽培管理(R3.7.)

(有) 丸 富

6月は早く梅雨入りしたものの、好天が多く、夏日が続き、空梅雨傾向だったので、収穫量が増えた。時折、激しく降った雨で、一部で病害が多発した。また、スリップスなど害虫が発生した。

害虫対策

近日点では、害虫の発生が多くなる。また、強風によりハウス周辺の害虫が飛び込むことがある。
害虫防除前に**バイオアクト TS 50～100cc/10a**を灌水し、害虫を土中から追い出す。
害虫防除時に**バイオアクト TS 2,000～3,000倍(又はスツパー-雅 1,000倍)**を散布する。

通気性の確保

高温障害の回避が大切。茎葉が混み合うと通気性が悪くなり、病害の発生や減収につながる。
茎葉の抑制に**時を越えた贈り物 0.3 kg(又は発根力 1 kg)/10a**と**サンミネーラ 50g/10a**を灌水する。
二次葉、ぎ葉の抑制に**時を越えた贈り物 500倍(酸カル 1,000倍)**と**サンミネーラ 5,000倍**を散布する。

発根促進

高温になると、土壌中の溶存酸素が低下するので、発根に必要な酸素を供給する。
発根促進と細根維持に**G バランス DF 0.5 kg/10a**と**発根力 0.5 kg(又は天地の恵み 0.3 kg)/10a**を灌水する。(15～20日毎に施用)

品質向上に

収穫量に応じて養分を消費する。収穫量が増えたら、養分の施用量・施用回数を増やす。
品質向上に**酸カル 1,000倍**と**天然ミネラル 2,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を散布する。
灌漑・散水で**酸カル 200 cc/10a**と**天然ミネラル 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を施用する。

生長促進

若茎の伸長を促進して、収穫量を増やす。
伸長促進に**バイオシャイングリーン 3 kg(又は天地の恵み 1 kg)/10a**と**サンミネーラ 100g/10a**を灌水する。
緑化促進に**天然ミネラル 2,000倍(又は酸カル 1,000倍)**と**サンミネーラ 5,000倍**を葉面散布する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥	5～10ℓ/10a	} 5～10日ごとに灌水する場合 ※収穫量や土壌条件、天候によって 加減する。
時を越えた贈り物	100～200 cc/10a	
サンミネーラ	50 cc/10a	
スツパー-雅(又はバイオアクト TS)	100cc(50cc)/10a	

※サンミネーラの代わりにシリアップ 100～150 cc、天然ミネラル 100～200 cc、海藻のエキス 50gでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)