

いちご栽培管理 (R3.7.)

(有) 丸 富

6月は早く梅雨入りしたものの、好天が多く、夏日が続き、空梅雨傾向だった。時折、激しく降った雨で、一部で病害が多発した。また、スリップスなど害虫が一部で発生した。

害虫対策

近日点では害虫の発生が盛んになるので、要注意。苗床周辺の環境変化による害虫の飛び込みに注意。
事前対策として**バイオアクトTS 50~70 cc/10a**を3~5日毎に散水、又は散布する。
事前の害虫対策として**バイオアクトTS 2,000~3,000倍**を防除時に混用散布する。

病害対策

硝酸態窒素が多い時に、病害が盛んに発生する。
窒素消化と抵抗性強化に**天然ミネラル 2,000倍**と**酸カル 1,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を散布する。
防除時に**天然ミネラル 3,000倍**と**酸カル 2,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を混用する。

徒長抑制

苗が混み合っていると軟弱徒長し、病害虫が発生しやすいので、必要以上の徒長を抑える。
軟弱徒長抑制に**時を越えた贈り物(又は酸カル、天然ミネラル)2,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を散布する。

不時出蕾抑制

ランナーを親株から切り離した後に置き肥をすると、不時出蕾が多くなる。
ランナーの切り離し前に**天地の恵み 500倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を灌注、又は散水する。
防除時に**笑顔 2,000倍(又は天地の恵み 1,000倍)**と**サンミネーラ 10,000倍**を混用する。

生長促進

苗の光合成を促進し、充実した葉の展開を促進する。
緑化促進に**笑顔 2,000倍(又は天地の恵み 1,000倍)**と**サンミネーラ 10,000倍**を散布する。
ランナーの発生が悪い時は**天地の恵み(又は発根力)500倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を灌注する。

追肥(液肥)

少量多回数で灌水、散水する。施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥	500~1000倍	} 5~7日毎に灌水する場合 ※状況に応じて加減する
時を越えた贈り物(又は酸カル)	1000~2000倍	
サンミネーラ	5000~10000倍	
バイオアクトTS	3000~5000倍	

※サンミネーラの代わりにシリアップ 5000~10000倍、天然ミネラル 2000~3000倍でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)