

いちご栽培管理 (R3.8.)

(有) 丸 富

7 月は梅雨明け後、好天に恵まれて真夏日が続く、高温干ばつ傾向だった。所によっては、雨が激しく降った。苗は高温により生育が鈍かった。病害は少なかったものの、スリップス、ヒメヨコバイなど害虫が一部で発生した。

生長促進

光合成を促進し、充実した葉の展開を促進する。

緑化促進に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布する。

ランナーの発生が悪い時は**天地の恵み(又は発根力)500 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を灌注(散水)する。

芽なし対策

育苗期間に肥料切れを起こすと、芽なし株が多くなる。肥料切れに注意して、肥培管理を行う。

置き肥やツグ肥料が切れる前から定植まで**天地の恵み 500 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を 5 日毎に灌注、又は散水する。

花芽分化促進

光合成を促進し、C/N 率を上げて花芽を誘導する。

花芽分化促進に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 3,000 倍**を散布する。

害虫対策

苗が混み合うと防除効果が低下し、病害虫が発生しやすい。害虫の発生が盛んな満月頃は、要注意。

軟弱徒長抑制に**時を越えた贈り物(又は酸カル、天然ミネラル)1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布する。

事前対策として**バイオアクトTS 50~70 cc/10a**を 3~5 日毎に散水、又は散布する。

事前の害虫対策として**バイオアクトTS 2,000~3,000 倍**を防除時に混用散布する。

病害対策

硝酸態窒素が多いと、病害の発生が多くなる。

窒素消化と抵抗性強化に**天然ミネラル 2,000 倍**と**酸カル 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布する。

防除時に**天然ミネラル 3,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を混用する。

追肥(液肥)

少量多回数で灌注、散水する。施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥 500~1000 倍

時を越えた贈り物(又は酸カル) 1000~2000 倍

サンミネーラ 5000~10000 倍

バイオアクト TS 3000~5000 倍

5~7 日毎に灌注する場合
※状況に応じて加減する

※サンミネーラの代わりにシカアップ[®] 5000~10000 倍、天然ミネラル 2000~3000 倍でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)