

アスパラガス栽培管理(R3.9.)

(有) 丸 富

8月上旬まで干ばつ酷暑だったが、中旬以降は梅雨に戻ったような曇雨天が続き、各地で豪雨(冠水)被害があった。盆頃までは病害が少なかったが、豪雨以降は各地で病害が拡大した。害虫も一部で発生した。

発根促進

8月の水害による土壌中の溶存酸素の低下と日照不足による根の働きの低下を早めに回復させる。
発根促進と細根維持に **Gバランス DF 500g/10a** と **発根力 500 cc(又は天地の恵み 300 cc)/10a** を灌水する。(15~20日毎に施用)

災害対策

台風や豪雨など災害が発生した場合は、速やかに防除を行うと共に樹勢回復を図る。
樹勢回復に **笑顔 1,000倍(又は天地の恵み 500倍)** と **サンミネーラ 10,000倍** を数回、葉面散布する。
緑化促進に **天然ミネラル 2,000倍(又は酸カル 1,000倍)** と **サンミネーラ 5,000倍** を葉面散布する。

貯蔵養分蓄積

来年の春芽は貯蔵養分の蓄積で左右する。終盤は収穫と養分蓄積の両方を考えながら肥培管理する。
養分蓄積と品質向上に **酸カル 1,000倍** と **天然ミネラル 2,000倍** と **サンミネーラ 10,000倍** を散布する。
灌水・散水で **酸カル 200 cc/10a** と **天然ミネラル 100 cc/10a** と **サンミネーラ 50 cc/10a** を施用する。

通気性の確保

茎葉が混み合うと通気性が悪くなり、病虫害の多発や養分蓄積に悪影響を及ぼす。
徒長抑制に **時を越えた贈り物 200~300 cc/10a** と **サンミネーラ 50~100 cc/10a** を灌水する。
二次葉の抑制に **時を越えた贈り物 500倍** と **酸カル 1,000倍** と **サンミネーラ 5,000倍** を散布する。

害虫対策

満月頃の強風時はハウス外からの害虫の侵入が多くなる。作物生育を予測して、事前対応が大切。
害虫防除前に **バイオアクト TS 50~100cc/10a** を灌水し、害虫を土中から追い出す。
害虫防除時に **バイオアクト TS 2,000~3,000倍(又はスツパー雅 1,000倍)** を散布する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥	1~2ℓ/10a	} 5~10日ごとに灌水する場合 ※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。
時を越えた贈り物	100~200 cc/10a	
サンミネーラ	50 cc/10a	
スツパー雅(又はバイオアクト TS)	100cc(50cc)/10a	

※サンミネーラの代わりにシカアップ 100~150 cc、天然ミネラル 100~200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)