

いちご栽培管理 (R3.11.)

(有) 丸 富

10 月前半は夏のような暑さが続き、各地で干ばつ傾向が続いた。後半には時々雨が降ったが、マルチ被覆まで雨が降らなかったところもあった。高温により腋花房の花芽分化にばらつきがあった。害虫の被害が多かった。

根張り促進

根張り(根量)に比例して、収穫量及び品質決まる。如何に根張りが、大事であるかがわかる。

発根促進に **G バランス DF 1 kg/10a** と **天地の恵み(又は発根力)1 kg/10a** を 30~45 日毎に灌水する。

肥大促進

花芽分化後は細胞分裂が続くので、多くの養分を必要とする。着花数や果実肥大も細胞分裂で決まる。

各花房が花芽分化したら、直ぐに**天地の恵み 1~2 kg/10a** と **サンミネーラ 50g/10a** を 2 回、灌水する。

出蕾時に**天地の恵み 300 倍(又は笑顔 1,000 倍)**と **サンミネーラ 10,000 倍**を 3 回散布する。(ジベ混用可)

着色促進

光合成を促進し、着色を促進させて、着果負担を軽減する。

着色促進に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と **サンミネーラ 10,000 倍**を数回、散布する。

軟弱徒長抑制に**酸カル(又は天然ミネラル、時を越えた贈り物)1,000 倍**と **サンミネーラ 3,000 倍**を散布する。

病害対策

軟弱徒長すると、病害の発生が多くなる。新月頃は栄養生長傾向になるので、特に注意する。

抵抗性強化に**時を越えた贈り物 500 倍**と **天然ミネラル(又は酸カル)1,000 倍**と **サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

防除時に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と **天然ミネラル(又は酸カル)2,000 倍**と **サンミネーラ 10,000 倍**を混用可。

害虫対策

今年は気温が高く、害虫の発生が盛んなので、特に満月頃は注意して観察する。

事前対策として**バイオアクトTS 50~70 cc/10a**を 5~7 日毎に散水、又は散布する。

日頃から害虫対策として**バイオアクトTS 2,000~3,000 倍**を防除時に混用散布する。

追肥(液肥)

施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥 2~3ℓ/10a

時を越えた贈り物(又は酸カル) 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50~100 cc/10a

バイオアクト TS 50~70 cc/10a

5~7 日毎に灌水する場合
※状況に応じて加減する

※サンミネーラの代わりにシカアップ[®] 100~150 cc、天然ミネラル 200~300 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)