

# いちご栽培管理 (R3.12.)

(有) 丸 富

11 月前半は暖かい日が続き、ハウス内は高温が続いた。蜂がハウスの天井付近を飛んで、受粉不良が多かった。後半は時々雨が降り、急に冷え込んだ。腋花房の花芽にかなりばらつきがあった。害虫の被害が多かった。

## 着色促進

寒くなると、積算温度が上がらず、着色が鈍る。着果負担を軽減する様、できる限り着色を促進する。  
着色促進に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を数回、葉面散布する。  
灌水(液肥)混用で**天地の恵み(又は天然ミネラル)200~300 cc/10a**と**サンミネーラ50cc/10a**を施用する。

## 肥大促進

収穫量が多くなると、それに応じて養分が必要となる。着花数や果実肥大に見合った肥培管理を行う。  
肥大促進に**K-40 250g/10a**と**サンミネーラ 50g/10a**を月に2回、灌水する。(新月前後に施用)  
灌水後に**天地の恵み 500 倍(又は笑顔 1,000 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布し、養分を吸収させる。

## 根張り促進

収穫量及び品質は根量で決まる。  
根張りに**GバランスDF 1 kg/10a**と**天地の恵み 0.5 kg(発根力 1 kg)/10a**を30~45日毎に灌水する。

## 病害対策

軟弱徒長すると、病害の発生が多くなる。新月頃は栄養生長傾向になるので、特に注意する。  
抵抗性強化に**時を越えた贈り物 500 倍(又はオリゴファイト 2,000 倍)**と**天然ミネラル(又は酸カル)1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。  
防除時に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**天然ミネラル(又は酸カル)2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を混用可。

## 害虫対策

各地でダニ、アブラムシ、スリップスなど害虫が多く発生しているのので、注意して観察する。(特に満月頃に)  
事前対策として**バイオアクトTS 50~70 cc/10a**を5~7日毎に散水、又は散布する。  
日頃から害虫対策として**バイオアクトTS 2,000~3,000 倍**を防除時に混用散布する。

## 追肥(液肥)

施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

|                 |                |                               |
|-----------------|----------------|-------------------------------|
| プロ液肥            | 3~7ℓ/10a       | } 5~7日毎に灌水する場合<br>※状況に応じて加減する |
| 時を越えた贈り物(又は酸カル) | 100~200 cc/10a |                               |
| サンミネーラ          | 50~100 cc/10a  |                               |
| バイオアクトTS        | 50~70 cc/10a   |                               |

※サンミネーラの代わりにシカアップ<sup>®</sup> 100~150 cc、天然ミネラル 200~300 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)