

野菜(トマト・ナス)栽培管理 (R3.11.)

(有) 丸 富

10 月前半は夏のような暑さが続き、各地で干ばつ傾向が続いた。後半は時々雨が降ったが、高温によりダニ、スリップス、ヨウムシ、オンシツコナジラミなど害虫の発生が多かった。

着色促進

曇雨天により日照不足が続いた場合は、光合成を促進する資材を葉面散布し、着色を促進する。

着色促進に**笑顔 1,000 倍**と**天然ミネラル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を数回、葉面散布する。

根から**天地の恵み 200 cc/10a**と**天然ミネラル 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を灌水する。

肥大促進

定植後の高温により根張りが悪い場合は、根張りの促進と共に養分転流を図り、果実肥大を促進する。

肥大促進に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**K-40 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を数回、

葉面散布する。

品質向上

遠日点では栄養生長傾向になるので、窒素過多や軟弱徒長、着花(果)不良、病害の発生を生じる。

緑化促進と徒長抑制に**天然ミネラル 2,000 倍**と**酸カル 1,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。

軟果対策に**酸カル 200 cc/10a**と**時を越えた贈り物 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を灌水する。

発根促進

収穫量に比例して根が弱るので、時々樹勢維持のために根づくりを行う。

発根促進に**G バランス DF 1 kg/10a**と**天地の恵み(発根力)1 kg/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を灌水。

樹勢維持に**笑顔 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を適宜、葉面散布(灌注)する。

害虫対策

ハウス周辺の害虫が強風によりハウス内へ侵入することがある。ハウス周辺環境にも注意する。

事前対応で**バイオアクト 50~70 cc/10a**を灌水して、害虫のハウス内への飛び込みを予防する。

防除時に忌避剤として**バイオアクト(又はスツパー雅)2,000~3,000 倍**を混用散布する。(農薬混用可)

追肥(液肥)

土質や生育状況、環境、肥培管理によって増減する。

天地の恵み(又は時を越えた贈り物) 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50~70 cc/10a

酸カル 50~70 cc/10a

バイオアクト TS 50~70 cc/10a

5~7 日毎に灌注する場合

※生育状況によって加減する。

※サンミネーラの代わりに、シカアップ[®] 100~200 cc、天然ミネラル(微量要素) 200 ccでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)