

野菜(トマト・ナス)栽培管理 (R3.12.)

(有) 丸 富

11 月前半は暖かい日が続き、ハウス内は高温が続いた。徐々に寒くはなったものの、日中のハウス内は比較的温度が高く、病害虫の発生が多かった。後半は時々雨が降り、急に冷え込んだ。

品質向上

地温が下がり、根の働きが悪くなると、着花(果)不良や病害の発生を生じる。

光合成の促進に**笑顔 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

軟果対策に**酸カル 200 cc/10a**と**時を越えた贈り物 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を灌水する。

発根促進

収穫を続けていくと、徐々に根が弱っていくので、時々樹勢維持のために根づくりを行う。

発根促進に**G バランス DF 1 kg/10a**と**天地の恵み 0.5 kg(又は発根力 1 kg)/10a**を 30~45 日毎に灌水する。

着色促進

日照不足が続いた場合は、光合成を促進し、着色を促す。

着色促進に**笑顔 1,000 倍**と**天然ミネラル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を数回、葉面散布する。

根から**天地の恵み 200 cc/10a**と**天然ミネラル 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を灌水する。

肥大促進

光合成を促進して地上部の展開を促すと共に、養分の転流を図り、果実の肥大を促進する。

肥大促進に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**K-40 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を数回、葉面散布する。

病害虫対策

病害虫はハウス外から風によって、ハウス内へ侵入することがあるので、ハウス周辺の環境にも注意する。

害虫の事前対応として**バイオアクト 50~70 cc/10a**を灌水して、害虫の飛び込みを予防する。

防除時に忌避剤として**バイオアクト(又はストッパー雅)2,000~3,000 倍**を混用散布する。(農薬混用可)

追肥(液肥)

土質や生育状況、環境、肥培管理によって増減する。

天地の恵み(又は時を越えた贈り物) 200~300 cc/10a

サンミネーラ 50~70 cc/10a

酸カル(又は天然ミネラル) 100~200 cc/10a

バイオアクト TS 50~70 cc/10a

5~7 日毎に灌注する場合

※生育状況によって加減する。

※サンミネーラの代わりに、シカアップ[®] 100~200 cc、天然ミネラル 200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)