

アスパラガス栽培管理(R4.1.)

(有) 丸 富

12 月前半は比較的暖かい日が多く、後半は曇天が多く、時々雨や雪が降り、冷え込んだ。低温に遭遇する時間が少なく、低温要求量を満たすのに時間がかかりそう。

全刈り

地上部の養分を地下茎に蓄えてから（地上部が水を上げないようになってから）全刈りを行う。

ガスバーナー焼却

落葉した葉や刈り取った茎の焼却、病害虫の殺虫殺菌対策のため、ガスバーナーで焼却処理する。

欠株対策

欠株部分の残根を取り除き、埋め戻す時に**ハイプロ**を土に 10%混ぜる。その後、埋め戻した土に**時を越えた贈り物(又は酸カル)1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散水する。

保温前に

萌芽促進に**天地の恵み(又は時を越えた贈り物)1~2ℓ / 10a**と**サンミネーラ 100 cc / 10a**を灌水する。

萌芽促進

春芽の萌芽には（休眠を打破する）温度が必要。天気が安定する日を選び、できる限り一気に地温が上がるように蒸し込む。

伸長促進

春芽が萌芽を始めたら、若茎をできる限り早く伸長させ、早く収穫する。

伸長促進に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 0.5~1ℓ / 10a

天地の恵み 100~200 cc / 10a

サンミネーラ 50 cc / 10a

ストップヤ(又はバイオアクト TS) 100cc(50cc) / 10a

5~10 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネーラの代わりにシリアップ 100~150 cc、天然ミネラル 100~200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)