

アスパラガス栽培管理 (R4.2.)

(有) 丸 富

1 月前半は比較的暖かい日が続いたが、後半は曇天で冷え込む日もあり、蒸し込み時期を少し悩んだ。保温開始から天気が良ければ、地温が上がるので、天気が春芽の萌芽・伸長を左右した。

萌芽

春芽の萌芽には温度が必要。天気が安定する日を選び、できる限り一気に地温が上がるように蒸し込む。いったん動き出したら、寒に合わないよう管理を行う。

伸長促進

萌芽を始めたら、生長点の樹液濃度を上げて、若茎をできる限り早く伸長させ、早く収穫する。伸長促進に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を若茎に葉面散布する。

害虫対策

近日点では害虫の発生が多くなる。事前対応で忌避剤などを活用して、害虫のハウス内への侵入を予防する。

害虫対策に**バイオアクト TS 50~70 cc(又はスツパー-雅 100~200 cc) / 10a**を5~7日毎に灌水する。

根張り促進

根の量に比例して品質や収穫量は決まる。吸収根の働きを活発にするよう、根に酸素を供給する。根張り促進に**G バランス DF 1 kg / 10a**と**天地の恵み 0.5 l(又は発根力 1 l) / 10a**を30~45日ごとに灌水する。

有害ガス

未熟有機物や有機質肥料、残根などが分解する際に発生する有害ガスが、根を痛めることがある。有害ガス除去に**G バランス DF 1 kg / 10a**を灌水する。又は**G バランス DF 3,000 倍**を散水する。

立茎

昨年の貯蔵養分や黄化状態を考慮して、春芽の収穫量を考えながら、立茎のタイミングを見計らう。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 2~3 l / 10a

天地の恵み 100~200 cc / 10a

サンミネーラ 50 cc / 10a

スツパー-雅(又はバイオアクト TS) 100cc(50cc) / 10a

5~10 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネーラの代わりにシカアップ 100~150 cc、天然ミネラル 100~200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)