

いちご栽培管理 (R4.2.)

(有) 丸 富

1 月前半は比較的好天に恵まれ、暖かい日が続いたが、後半はなり疲れ傾向と曇天で冷え込む日もあり、生育が鈍く、収穫量が伸び悩んだ。なり疲れなどで、樹勢低下したところで、ダニなど害虫被害が多かった。

着色促進

徒長すると、光合成養分が茎葉に転流するため、着色が鈍る。芯葉の動きを観察して、電照管理する。
着色促進に**笑顔 500～1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を数回、散布する。
灌水に**天地の恵み(又は天然ミネラル)200～300 cc/10a**と**サンミネーラ50cc/10a**を施用、着色促進する。

ネズミ・害虫対策

近日点では害虫の発生が多くなるので、特にダニ、スリップスなど害虫に注意して観察する。(特に満月頃に)ネズミ、ダニなどの事前対策として**バイオアクトTS 50～70 cc/10a**を5～7日毎に散水、又は散布する。
日頃から害虫対策として**バイオアクトTS 2,000～3,000 倍**を防除時に混用散布する。

肥大促進

着花(果)数や果実肥大に見合った肥培管理を行う。
肥大促進に**K-40 250g/10a**と**サンミネーラ 50g/10a**を月に2回、灌水する。(特に新月前後に施用)
灌水後に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布、液肥吸収を促進する。

根張り促進

なり疲れの回復に、発根促進する。収穫量及び品質は根量で決まる。
根張りに**GバランスDF 1 kg/10a**と**天地の恵み 0.5 kg(発根力 1 kg)/10a**を30～45日毎に灌水する。

病害対策

なり疲れなどで根の働きが低下すると窒素過多になる。新月頃は窒素過多になりやすいので、注意する。
窒素消化に**時を越えた贈り物 500 倍(又はオリゴファイト 2,000 倍)**と**天然ミネラル(又は酸カル)1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。
防除時に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**天然ミネラル(又は酸カル)2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を混用可。

追肥(液肥)

施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥	3～7ℓ/10a	} 5～7日毎に灌水する場合 ※状況に応じて加減する
時を越えた贈り物(又は酸カル)	100～200 cc/10a	
サンミネーラ	50～100 cc/10a	
バイオアクトTS	50～70 cc/10a	

※サンミネーラの代わりにシカアップ[®] 100～150 cc、天然ミネラル 200～300 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)