

アスパラガス栽培管理 (R4.3.)

(有) 丸 富

2 月前半は比較的曇天が多く、地温が上がらず、後半は好天で朝晩が冷え込み、地温が低温傾向だった。地温が低温のため、根の働きが鈍く若茎がやや細く、春芽の収穫量が伸び悩んだ。

伸長促進

春芽は昨年の貯蔵養分と根が吸収した養分で生長するので、できる限り生長点の樹液濃度を上げて、若茎を早く伸長させ、早く収穫する。

伸長促進に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を若茎に直接散布する。

立茎前に

春芽をある程度収穫したら、立茎がスムーズにできるよう、樹勢回復が必要。できる限り新月前後に樹勢回復を図る。

立茎促進に**天地の恵み 1ℓ(又は笑顔 200 cc) / 10a**と**サンミネーラ 100 cc / 10a**を散水、灌水する。

立茎後に

立茎が 7~8 割ぐらいできたら、若葉が光合成を早くできるよう、茎葉の緑化を促進する。夏芽の発生を促進する。

緑化促進に**天然ミネラル(又は時を越えた贈り物) 2,000 倍**と**サンミネーラ 3,000 倍**を葉面散布する。

害虫対策

近日点では害虫の発生が多くなる。事前対策として、忌避剤などを活用して、害虫のハウス内への侵入を予防する。

害虫対策に**バイオアクト TS 50~70 cc(又はスツパー-雅 100~200 cc) / 10a**を 5~7 日毎に灌水する。

根張り促進

吸収根の働きを活発にするよう、根に酸素を供給する。

根張り促進に**G バランス DF 1 kg / 10a**と**天地の恵み 0.5ℓ(又は発根力 1ℓ) / 10a**を灌水する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 3~5ℓ / 10a

天地の恵み 100~200 cc / 10a

サンミネーラ 50 cc / 10a

スツパー-雅(又はバイオアクト TS) 100cc(50cc) / 10a

5~10 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネーラの代わりにシカアップ 100~150 cc、天然ミネラル 100~200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)