

いちご栽培管理 (R4.3.)

(有) 丸 富

2 月前半は比較的曇天が多く、寒い日が続いたが、後半は好天干ばつ傾向で、ハウス内は暑い日もあった。下旬以降、生育が進み収穫量が増えた。なり疲れで樹勢が低下したところは、ダニなど害虫が急激に増えた。

軟弱徒長抑制

軟弱徒長すると、病虫害の発生が多くなり、防除効果が低下するので、芯葉の動きを観察して抑制する。

徒長抑制に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**酸カル 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

灌水に**酸カル 50～100 cc／10a**と**天然ミネラル 100～200 cc／10a**と**サンミネーラ 50 cc／10a**を施用する。

害虫対策

近日点では害虫の発生が多くなるので、特にダニ、スリップスなど害虫に注意して観察する。(特に満月頃に)ネズミ、ダニなどの事前対策として**バイオアクトTS 50～70 cc／10a**を3～5日毎に灌水する。

日頃から害虫対策として**バイオアクトTS 2,000～3,000 倍**を防除時に混用する。

病害対策

ハウスのサイドビニールを開けて換気を始めると、病虫害がハウス内へ侵入する。新月頃は病害の発生に注意する。

窒素消化促進に**時を越えた贈り物 500 倍(又はオリゴファイト 2,000 倍)**と**天然ミネラル(又は酸カル)1,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。

防除時に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**天然ミネラル(又は酸カル)2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を混用可。

軟弱果対策

株の充実を図り、果実の充実や日持ち促進、品質向上に見合った肥培管理を行う。

品質向上に**時を越えた贈り物 100～200 cc／10a**と**酸カル 100～200 cc／10a**と**サンミネーラ 50～100 cc／10a**を必要に応じて灌水する。

灌水後に**酸カル 1,000 倍(又は天然ミネラル 2,000 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

親株管理

近日点では花芽分化しやすいので、ランナー分化を促進するよう、早めに追肥する。

根張り促進に**G バランス DF 5,000 倍**と**天地の恵み 1,000 倍(又は発根力 1,000 倍 1 kg)**を散水する。

追肥(液肥)

施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥	2～5 L／10a
時を越えた贈り物(又は酸カル)	100～200 cc／10a
サンミネーラ	50～100 cc／10a
バイオアクト TS	50～70 cc／10a

5～7 日毎に灌水する場合
※状況に応じて加減する

※サンミネーラの代わりにシカアップ 100～150 cc、天然ミネラル 150～200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)